herpy

GECKOS

Chameleon gecko

Carphodactylus laevis

Carphodactylus laevis est un gecko svelte et nocturne des forêts tropicales humides du nord-est du Queensland. Il possède de longues pattes grêles, des griffes au bout des doigts, une crête le long du dos et une queue en forme de carotte, et sa morphologie diffère totalement de celle de la plupart des geckos. Les animaux nés en captivité sont robustes et se reproduisent volontiers, mais l'espèce reste rare en terrarium.

Famille: Carphodactylidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**11-13 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Difficulté	**Intermédiaire**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**24-36 mois**
Taille de la ponte	**2 œufs**
Pontes par an	**4-6**
Incubation	**90-133 jours** à 21-27 °C

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 35 × 70 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**22-28 °C**
Température, nuit	**16-22 °C**
Hygrométrie	**75-100 %**
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul ou en couple**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe III**
Annexe UE	**Annexe C**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*Carphodactylus laevis* a besoin d'un terrarium haut, qui laisse aux animaux la place de s'éviter.
TEMPÉRATURE	*Carphodactylus laevis* a de faibles besoins en chaleur. En journée, le terrarium doit se situer entre 22 et 28 °C, et la nuit la température baisse de 5-6 degrés, soit environ 16-22 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'hygrométrie est déterminante pour *Carphodactylus laevis* et doit rester en permanence entre 75 et 100 %.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*Carphodactylus laevis* est nocturne et vit caché le jour ; les UVB ne sont donc pas nécessaires. La lumière du jour d'une fenêtre voisine suffit ; sinon, un éclairage LED faible ou un tube fluorescent.
ALIMENTATION	*Carphodactylus laevis* n'est pas difficile une fois habitué à la captivité. Les grillons peuvent constituer presque toute l'alimentation, de préférence complétés par des blattes. Nourrissez 2-3 fois par semaine.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Carphodactylus laevis* est calme et caché le jour, et devient actif quelques minutes après la tombée de la nuit. Il se poste alors sur une branche ou un morceau d'écorce et reste souvent immobile pendant des heures.
AIRE D'ORIGINE	Australie.