herpy

GECKOS

Pacific gecko

Dactylocnemis pacificus

Un gecko nocturne nerveux, rapide et joliment dessiné, originaire du nord-ouest de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, où il vit dans les broussailles, les forêts et sur les côtes rocheuses. Il met bas des petits vivants, atteint 14-18 cm de long et peut vivre plus de 20 ans. Il se plaît dans un climat frais et tempéré.

Famille: Diplodactylidae Ancien nom: *Hoplodactylus pacificus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**14-18 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**20-25 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Arboricole, rupicole et terrestre**
Habitat	**Terrain rocheux et forêt et prairie tempérées**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 50 × 100 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**18-24 °C**
Température, nuit	**12-18 °C**
Hygrométrie	**50-80 %**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes, fruits et nectar**
Détention	**Seul ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Vivipare**
Maturité sexuelle	**18-24 mois**
Taille de la portée	**1-2 petits**
Pontes par an	**1**
Gestation	**270-360 jours**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe III**
Annexe UE	**Annexe C**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Les soins à apporter à *Dactylocnemis pacificus* ne sont que sommairement décrits.
TEMPÉRATURE	Les températures ne sont pas documentées pour l'espèce en captivité et suivent le climat de l'aire de répartition.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être de 50-80 %. Vaporisez légèrement le terrarium le soir, afin que les feuilles et l'écorce soient humides pendant la nuit, et laissez-le sécher en partie au cours de la journée.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*Dactylocnemis pacificus* est nocturne et ne se chauffe que cachée près de son abri diurne ; aucun besoin en UVB n'est donc documenté.
ALIMENTATION	*Dactylocnemis pacificus* est omnivore, mais se nourrit surtout d'insectes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Dactylocnemis pacificus* est rapide, nerveuse et perd facilement sa queue ; la manipulation doit donc être réduite au minimum.
AIRE D'ORIGINE	Nouvelle-Zélande.