herpy

GECKOS

Bauer's chameleon gecko

Eurydactylodes agricolae

Eurydactylodes agricolae est un petit gecko svelte et grimpeur, originaire des forêts du nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, à la peau granuleuse vert olive à vert mousse, marquée de taches jaunes autour de la bouche et sur les membres. Il supporte mal la chaleur, mais n'est pas difficile à entretenir dans un terrarium frais, humide et densément planté.

Famille: Diplodactylidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**5-6 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour et au crépuscule**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**30 × 30 × 45 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**18-24 °C**
Température, nuit	**16-20 °C**
Hygrométrie	**60-90 %**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et aliment complet**
Détention	**Seul, en couple ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**18-36 mois**
Taille de la ponte	**1-2 œufs**
Pontes par an	**5-7**
Incubation	**60-120 jours** à 22-25 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Quasi menacée (NT)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un adulte de *Eurydactylodes agricolae* ou un couple peut être maintenu dans un terrarium d'au moins 30 × 30 × 45 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus haut est toujours mieux.
TEMPÉRATURE	*Eurydactylodes agricolae* provient de forêts à température modérée et supporte mal la chaleur. Maintenez 18-24 °C le jour : les animaux se portent bien à température ambiante normale.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air chez *Eurydactylodes agricolae* doit être modérée à élevée et varier au cours de la journée. Visez 60-70 % en journée et 80-90 % après la vaporisation du soir.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*Eurydactylodes agricolae* est actif le jour et au crépuscule, et aime se chauffer sous la lumière UVB. Offrez un rythme jour-nuit régulier avec 10 à 14 heures de lumière. Les UVB ne sont pas strictement nécessaires.
ALIMENTATION	L'alimentation de base de *Eurydactylodes agricolae* est une pâtée en poudre toute prête pour geckos néo-calédoniens frugivores, délayée en une bouillie souple.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Eurydactylodes agricolae* est petit, rapide et fragile, et avant tout un animal à observer. Avec de la patience, il peut s'habituer à des manipulations brèves et calmes.
AIRE D'ORIGINE	Nouvelle-Calédonie.