herpy

GECKOS

## Symmetrical gecko

# *Eurydactylodes symmetricus*

*Eurydactylodes symmetricus* est un petit gecko nocturne et rare, qui vit dans le maquis et la forêt du sud de la Nouvelle-Calédonie. Il se distingue par de grandes écailles céphaliques disposées symétriquement et par une queue préhensile. Il est beaucoup moins connu que ses congénères *Eurydactylodes agricolae* et *Eurydactylodes vieillardi*, mais l'entretien est probablement presque identique.

Famille: Diplodactylidae  Ancien nom: *Eurydactylus symmetricus*

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **10-13 cm**<br>longueur totale queue comprise |
| Espérance de vie | **10-15 ans** |
| Activité | **La nuit** |
| Mode de vie | **Arboricole** |
| Habitat | **Forêt tropicale humide** |
| Difficulté | **Intermédiaire** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **45 × 45 × 60 cm**<br>L × l × H pour 1 adulte |
| Température, jour | **22-26 °C** |
| Zone de bain de soleil | **27-29 °C** |
| Température, nuit | **20-23 °C** |
| Hygrométrie | **60-80 %** |
| UVB | **Recommandés**<br>Zone de Ferguson 1 |
| Alimentation | **Insectes, fruits et aliment complet** |
| Détention | **Seul, en couple ou un mâle avec plusieurs femelles** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Taille de la ponte | **1-2 œufs** |
| Incubation | **50-90 jours**<br>à 22-26 °C |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Non inscrite** |
| Annexe UE | **Non inscrite** |
| UICN | **Quasi menacée (NT)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| **LE TERRARIUM** | On dispose de peu de connaissances sur l'entretien d'*Eurydactylodes symmetricus*. Les valeurs données ici sont empruntées à *Eurydactylodes vieillardi* et *Eurydactylodes agricolae*, de taille et de mode de vie similaires. |
| **TEMPÉRATURE** | Prévoyez un point chaud de 27-29 °C sous une lampe et une zone fraîche de 21-24 °C. Pendant la journée, la température dans la majeure partie du terrarium se situe entre 22 et 26 °C, et la nuit elle descend à 20-23 °C. |
| **HYGROMÉTRIE ET EAU** | Maintenez l'hygrométrie à 60-80 %, mesurée au milieu du terrarium. Elle doit augmenter la nuit et baisser au cours de la journée, sans jamais descendre sous 50 %. |
| **ÉCLAIRAGE ET UVB** | L'espèce est nocturne et peut se passer d'UVB lorsque l'alimentation contient de la vitamine D3, mais un éclairage UVB faible est un avantage. |
| **ALIMENTATION** | L'espèce est probablement frugivore et insectivore, comme les autres espèces du genre. |
| **COMPORTEMENT ET MANIPULATION** | Les espèces du genre sont petites, relativement calmes et peuvent s'habituer à la manipulation. Laissez un nouvel animal tranquille pendant deux semaines et ne le manipulez que s'il a mangé. |
| **AIRE D'ORIGINE** | Nouvelle-Calédonie. |