herpy

GECKOS

## Gecko à queue grasse

# *Hemitheconyx caudicinctus*

Un gecko paisible, terrestre, des savanes d'Afrique de l'Ouest, doté d'une queue épaisse en forme de cône qui sert de réserve de nourriture. Il est apparenté à *Eublepharis macularius* et lui ressemble beaucoup, mais préfère un peu plus d'humidité. Il est facile à élever et constitue un bon premier choix pour qui souhaite un gecko calme vivant au sol.

Famille: Eublepharidae  Nom anglais: African fat-tailed gecko  Ancien nom: *Stenodactylus caudi-cinctus; Psilodactylus caudicinctus*

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **18-23 cm**<br>longueur totale queue comprise |
| Poids | **40-75 g** |
| Espérance de vie | **15-20 ans** |
| Activité | **Au crépuscule et la nuit** |
| Mode de vie | **Terrestre** |
| Habitat | **Savane et forêt sèche** |
| Difficulté | **Débutant** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **60 × 30 × 30 cm**<br>L × l × H pour 1 adulte |
| Température, jour | **25-28 °C** |
| Zone de bain de soleil | **30-32 °C** |
| Température, nuit | **20-24 °C** |
| Hygrométrie | **40-70 %** |
| UVB | **Facultatifs**<br>Zone de Ferguson 1 |
| Alimentation | **Insectes** |
| Détention | **Seul ou un mâle avec plusieurs femelles** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Maturité sexuelle | **8-12 mois** |
| Taille de la ponte | **1-2 œufs** |
| Pontes par an | **3-5** |
| Incubation | **43-70 jours**<br>à 28-32 °C |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Non inscrite** |
| Annexe UE | **Non inscrite** |
| UICN | **Préoccupation mineure (LC)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| **LE TERRARIUM** | Un seul gecko adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 60 × 30 × 30 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand est toujours préférable. C'est la surface au sol qui compte, car l'espèce vit au sol. |
| **TEMPÉRATURE** | Offrez au gecko un net gradient de température d'une extrémité à l'autre. La zone fraîche doit se maintenir à 25-28 °C, et le point chaud à 30-32 °C mesuré en surface. La nuit, la température peut descendre à 20-24 °C. |
| **HYGROMÉTRIE ET EAU** | L'espèce vient de régions sèches, mais ne doit pas être gardée tout à fait au sec. Maintenez l'hygrométrie du terrarium à 40-60 % et laissez-la volontiers monter vers 70 % par périodes, la cachette humide restant toujours humide. |
| **ÉCLAIRAGE ET UVB** | Le gecko est actif au crépuscule et la nuit et se débrouille sans UVB lorsqu'il reçoit de la vitamine D3 par complément. |
| **ALIMENTATION** | *Hemitheconyx caudicinctus* se nourrit d'insectes. La base de l'alimentation est composée de grillons, de blattes dubia et d'insectes similaires, nourris correctement pendant quelques jours avant d'être donnés. |
| **COMPORTEMENT ET MANIPULATION** | *Hemitheconyx caudicinctus* est calme et facile à manipuler. Il dort le jour dans une cachette : manipulez-le donc le soir, et laissez-lui une ou deux semaines pour s'habituer avant de le prendre en main. |
| **AIRE D'ORIGINE** | Sénégal, Gambie, Guinée, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Niger, Nigeria et Cameroun. |