herpy

GECKOS

Madagascar day gecko

Phelsuma madagascariensis

Phelsuma madagascariensis est un grand gecko diurne vert de la côte est et du nord-est de Madagascar, doté d'une bande rouge allant de la narine à l'œil et de lamelles adhésives sous les doigts, qui lui permettent de s'accrocher au verre et au bambou. Actif en journée, il exige des UVB et un point chaud, et convient à celui qui veut observer ses geckos en pleine activité.

Famille: Gekkonidae Ancien nom: *Gekko madagascariensis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**20-25 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 60 × 120 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**26-30 °C**
Zone de bain de soleil	**30-35 °C**
Température, nuit	**23-26 °C**
Hygrométrie	**50-75 %**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes, fruits, nectar et aliment complet**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**12-24 mois**
Taille de la ponte	**1-2 œufs**
Pontes par an	**3-4**
Incubation	**47-82 jours** à 25-29 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'indications d'élevage pour *Phelsuma madagascariensis* lui-même ; les chiffres des sections consacrées à l'entretien et à l'élevage proviennent donc de *Phelsuma grandis*, une espèce proche et de même taille.
TEMPÉRATURE	L'espèce exige un gradient de température net. Le point le plus chaud, une branche juste sous une ampoule chauffante, doit se situer autour de 30-35 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit se situer autour de 50-75 % mesurée au milieu du terrarium. Elle peut monter la nuit et baisser au cours de la journée.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est active de jour et a besoin d'un éclairage puissant et d'UVB. Utilisez un tube UVB pouvant donner un indice UV d'environ 3-4 sur la branche de bain de soleil (zone Ferguson 3).
ALIMENTATION	L'espèce mange des insectes et d'autres petits arthropodes, ainsi que, de temps en temps, des fruits et du nectar.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est territoriale et agressive envers ses congénères, surtout les jeunes. Deux mâles ne doivent jamais être gardés ensemble, car ils se battent jusqu'à ce que le plus faible soit blessé ou mort.
AIRE D'ORIGINE	Madagascar.