herpy

GECKOS

Middle Eastern short-fingered gecko

Stenodactylus doriae

L'une des plus grandes espèces du genre *Stenodactylus* : un gecko terrestre, svelte et nocturne, aux pattes longues et aux doigts frangés, qui s'enfouit dans le sable pendant la journée. On dispose de peu d'informations sur son entretien, mais l'espèce peut être maintenue comme ses plus proches parentes dans un terrarium sec à fond sablonneux.

Famille: Gekkonidae Ancien nom: *Ceramodactylus doriae; Ceramodactylus major; Stenodactylus major*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**5-8 cm** longueur museau-cloaque
Poids	**5-11 g**
Espérance de vie	**9-10 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Désert**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 40 × 20 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**24-29 °C**
Zone de bain de soleil	**35-38 °C**
Température, nuit	**18-24 °C**
Hygrométrie	**40-60 %**
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul, en couple ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**8 mois**
Taille de la ponte	**1-2 œufs**
Incubation	**60-80 jours** à 27-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien de *Stenodactylus doriae*. L'installation suit celle de ses plus proches parentes, *Stenodactylus petrii* et *Stenodactylus sthenodactylus*, qui proviennent des mêmes déserts.
TEMPÉRATURE	Pendant la journée, la température doit être de 24-29 °C dans le terrarium et de 35-38 °C au point le plus chaud, par exemple au-dessus d'un tapis chauffant ou d'un câble chauffant placé sous le fond, ou sous une lampe à une extrémité.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'air doit être faiblement à modérément humide, autour de 40-60 %. Vaporisez légèrement une partie du terrarium le soir, une à deux fois par semaine, de façon à créer des zones humides et des gouttelettes, et laissez le reste sec.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est nocturne et peut vivre sans UVB lorsqu'elle reçoit du calcium avec de la vitamine D3 par l'alimentation.
ALIMENTATION	L'alimentation de base se compose d'insectes vivants, surtout des grillons, complétés par des larves de fausse teigne, des vers de farine, des mini-vers de farine et des drosophiles aptères.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Stenodactylus doriae* n'est pas un animal à manipuler. Il est rapide et fragile, et la queue peut être perdue. Les animaux sortent à la tombée de la nuit et passent la journée dans leurs galeries.
AIRE D'ORIGINE	Arabie saoudite, Qatar, Iran, Irak, Israël, Émirats arabes unis, Oman, Jordanie et Koweït.