herpy

DENDROBATES

Brazil-nut Poison Frog

Adelphobates castaneoticus

Adelphobates castaneoticus est un petit dendrobate d'un noir brillant, marqué de taches blanches ou jaunâtres et de taches orange vif à l'avant-bras et aux genoux. Il vit sur le sol forestier de l'État du Pará, dans l'Amazonie brésilienne. Son nom évoque le noyer du Brésil (noix du Pará) : le mâle utilise les coques vides de ses fruits comme bassins pour les têtards. On ne dispose que de peu d'informations sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates castaneoticus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**18-23 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**24-27 °C**
Température, nuit	**20-24 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**5-7 mois**
Œufs par ponte	**4-8**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**60-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et autres têtards**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien d'*Adelphobates castaneoticus*. L'espèce vit dans la litière du sol forestier, sous un climat de plaine chaud et humide.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit se situer entre 24 et 27 °C, et elle baisse de 3-4 °C la nuit, à 20-24 °C. La variation au cours de l'année doit être faible, 1-2 °C. Cela correspond au climat de plaine du Pará.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité doit être d'environ 70-80 % en milieu de journée et proche de 100 % le matin et le soir, et la litière ainsi que le substrat doivent rester humides en permanence.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une gamelle d'eau n'est pas nécessaire, sauf si l'on souhaite obtenir des jeunes. Les grenouilles trouvent l'humidité dans la vaporisation et dans les feuilles humides.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Offrez 10-12 heures de lumière par jour avec des tubes fluorescents ou des LED pour les plantes.
ALIMENTATION	*A. castaneoticus* se nourrit dans la nature de fourmis, de termites et d'autres petits arthropodes. En captivité, on la nourrit de collemboles, de petites drosophiles et de petits isopodes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*A. castaneoticus* est diurne et vit surtout sur le sol forestier. Le tempérament et le comportement territorial ne sont pas documentés, mais *A. galactonotus* peut devenir agressive envers ses congénères à la maturité sexuelle.
AIRE D'ORIGINE	Brésil.