herpy

DENDROBATES

Rio Madeira Poison Frog

Adelphobates quinquevittatus

Adelphobates quinquevittatus est une très petite grenouille dendrobate d'un noir laqué brillant, mesurant 14-16 mm, ornée de rayures blanches et de pattes grises, verdâtres ou orange. Elle vit dans la litière de la forêt tropicale humide, dans le bassin versant du Madeira, au sud de l'Amazonie, et n'est que rarement maintenue en terrarium. On sait très peu de choses sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates quinquevittatus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**14-16 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**24-27 °C**
Température, nuit	**20-24 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**4-8**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**60-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et autres têtards**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de très peu d'informations sur l'entretien de *Adelphobates quinquevittatus*. L'espèce vit dans la litière, sous un climat de plaine chaud et humide.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit se situer entre 24 et 27 °C et elle baisse de 3-4 °C la nuit, pour atteindre 20-24 °C. La variation au cours de l'année doit être faible, 1-2 °C. Cela correspond au climat de plaine du Rondônia.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit être d'environ 70-80 % en milieu de journée et proche de 100 % le matin et le soir, et la litière comme le substrat doivent rester humides en permanence.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un bac à eau n'est pas nécessaire, sauf si l'on souhaite obtenir une descendance. Les grenouilles trouvent l'humidité grâce à la pulvérisation et à la litière humide.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Offrez 10-12 heures de lumière par jour avec des tubes fluorescents ou des LED pour les plantes.
ALIMENTATION	Dans la nature, *A. quinquevittatus* se nourrit surtout de fourmis et de termites.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*A. quinquevittatus* est diurne et vit surtout dans la litière. Le tempérament et le comportement territorial ne sont pas documentés.
AIRE D'ORIGINE	Brésil.