herpy

DENDROBATES

Brilliant-thighed Poison Frog

Allobates femoralis

Allobates femoralis est une petite grenouille sombre de 3 à 4 cm, originaire de l'Amazonie et du bouclier guyanais, qui porte une tache orange jaunâtre derrière le bras et une tache orange en demi-lune sur la cuisse. Elle est diurne et terrestre ; les mâles défendent leur territoire par un chant puissant, et leur parade nuptiale est l'une des plus longues parmi les grenouilles à flèches empoisonnées. L'espèce appartient à la famille des Aromobatidae et est considérée comme non toxique.

Famille: Aromobatidae Ancien nom: *Epipedobates femoralis; Phyllobates femoralis; Dendrobates femoralis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3-4 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées	**Aucune connue**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**25-28 °C**
Température, nuit	**21-24 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**8-20**
Éclosion	**15-20 jours**
Durée du stade larvaire	**40-50 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple d'*Allobates femoralis* demande un terrarium en verre d'au moins 60 × 40 × 40 cm. L'espèce vit au sol, de sorte que c'est la surface au sol qui compte le plus, mais les mâles grimpent volontiers un peu pour chanter.
TEMPÉRATURE	La journée, la température doit être de 25 à 28 °C et la nuit de 21 à 24 °C, soit 3 à 4 degrés de moins. Cette variation quotidienne correspond aux conditions de la Guyane française et favorise la reproduction.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité doit être élevée : 70 à 80 % en milieu de journée et jusqu'à près de 100 % le matin et le soir.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Proposez un bac en verre peu profond d'environ 10 cm de diamètre, avec 1 à 2 cm d'eau, dont les grenouilles sortent facilement. Le mâle l'utilise aussi pour déposer les têtards.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est avant tout destiné aux plantes. Prévoyez 12 heures de lumière par jour, par exemple de 7 h à 19 h.
ALIMENTATION	*Allobates femoralis* se nourrit de petits insectes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Allobates femoralis* est diurne, et les mâles sont territoriaux.
AIRE D'ORIGINE	Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyane française, Guyana, Pérou et Suriname.