herpy

DENDROBATES

Sanguine Poison Frog

Allobates zaparo

Allobates zaparo est une petite grenouille diurne d'environ 3 cm, de la forêt tropicale du piémont andin en Équateur et du nord du Pérou. Les adultes ont le dos rouge, les flancs noirs, le ventre bleu et des taches jaunes près des pattes ; ils imitent les *Ameerega bilinguis* et *Ameerega parvula*, toxiques, mais ne sont pas venimeux. L'espèce est rarement maintenue : les soins reposent donc sur le climat et sur l'espèce apparentée *Allobates femoralis*.

Famille: Aromobatidae Ancien nom: *Epipedobates zaparo; Phyllobates zaparo; Dendrobates zaparo*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées	**Aucune connue**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**24-27 °C**
Température, nuit	**21-23 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**8-20**
Éclosion	**15-20 jours**
Durée du stade larvaire	**40-50 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur les soins à apporter à *Allobates zaparo*. L'espèce est rarement maintenue en captivité et sa reproduction en captivité n'est pas décrite.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 24-27 °C le jour et à 21-23 °C la nuit. Ces valeurs suivent le climat des basses terres équatoriennes au pied des Andes. La variation au cours de l'année doit être faible, de 1-2 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 70-80 % en milieu de journée et proche de 100 % le matin et le soir.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Proposez un bac en verre bas contenant 1-2 cm d'eau, dont les grenouilles peuvent facilement sortir. Les adultes l'utilisent pour déposer les têtards.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est avant tout destiné aux plantes : 10-12 heures par jour avec des LED à spectre adapté aux plantes. Il n'est pas démontré qu'*Allobates zaparo* ait besoin d'UVB.
ALIMENTATION	Dans la nature, les fourmis constituent une part importante du régime.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Allobates zaparo* est diurne et vit dans la litière de feuilles. Les mâles appellent depuis le dessus des feuilles pour attirer les femelles.
AIRE D'ORIGINE	Équateur et Pérou.