herpy

DENDROBATES

Pleasing Poison Frog

Ameerega bassleri

Ameerega bassleri est une grenouille dendrobate diurne d'un peu moins de 4 cm, originaire des forêts humides du piémont oriental des Andes, dans le nord du Pérou. Le mâle veille sur les œufs et transporte les têtards jusqu'à l'eau ; l'espèce doit être maintenue à une température plus fraîche que la plupart des dendrobates. On dispose de peu de données sur son entretien, et l'espèce est vulnérable dans la nature.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Epipedobates bassleri; Dendrobates bassleri; Phobobates bassleri*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**4 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-12 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 50 × 55 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**18-21 °C**
Température, nuit	**13-17 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)**
Maturité sexuelle	**12-13 mois**
Œufs par ponte	**40**
Éclosion	**10 jours**
Durée du stade larvaire	**50-60 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de données sur l'entretien d'*Ameerega bassleri*. L'espèce vit en forêt humide, près des ruisseaux, entre 300 et 1 200 m d'altitude, là où l'air est plus frais que chez la plupart des dendrobates.
TEMPÉRATURE	L'espèce ne doit pas être maintenue trop chaude. En journée, 18-21 °C conviennent, et la nuit la température doit baisser de 4-6 °C, jusqu'à environ 13-17 °C. L'écart entre les saisons n'est que de 1-2 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit se situer entre 70 et 100 %. Le matin et le soir, elle est proche de 100 % avec de la brume, tandis qu'au milieu de la journée elle peut descendre jusqu'à environ 70 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Le terrarium doit comporter un bac d'eau de 1-2 cm de profondeur, et une pièce d'eau fixe ou de petits récipients servent aux têtards en cas de reproduction.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce vit sur le sol forestier, où ne parvient que peu de lumière. Un éclairage LED au spectre adapté aux plantes et une durée de jour de 10-12 heures suffisent.
ALIMENTATION	L'espèce accepte les petites proies habituelles : drosophiles, collemboles, grillons tout juste éclos, plus petites larves de fausse teigne et petits insectes récoltés au filet fauchoir dans les prairies.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est diurne et vit au sol. Le mâle est territorial et chante pour défendre son domaine ; les animaux doivent donc disposer de nombreuses cachettes et de lignes de vue interrompues.
AIRE D'ORIGINE	Pérou.