herpy

DENDROBATES

Cainarachi Poison Frog

Ameerega cainarachi

Ameerega cainarachi est une grenouille à dards empoisonnés à dos rouge d'environ 3 cm, connue uniquement du piémont andin autour de Tarapoto, dans le nord du Pérou. L'espèce est menacée à l'état sauvage et l'on dispose de peu d'informations sur son entretien ; ce guide s'appuie donc sur le climat, l'habitat et les proches parents *Ameerega bassleri* et *Ameerega pepperi*.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**22-26 °C**
Température, nuit	**19-22 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**12-13 mois**
Œufs par ponte	**22-44**
Éclosion	**10 jours**
Durée du stade larvaire	**50-60 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien de *Ameerega cainarachi*.
TEMPÉRATURE	En journée, 22-26 °C conviennent, et la nuit la température doit baisser jusqu'à 5 °C, soit environ 19-22 °C. L'écart entre les saisons n'est que de 1-2 °C. Il n'y a pas de repos hivernal.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit se situer entre 70 et 100 % : environ 70 % en milieu de journée et près de 100 % avec de la brume le matin et le soir. Vaporisez ou utilisez le système de pluie et le brumisateur plusieurs fois par jour.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un récipient d'eau peu profond, avec 1-2 cm d'eau, suffit ; il doit être facile d'y entrer et d'en sortir.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage doit avant tout couvrir les besoins des plantes : LED horticole pendant 10-12 heures par jour, avec une vraie nuit. Le besoin en UVB n'est pas documenté ; une lampe UVB faible (zone 1 de Ferguson) est facultative.
ALIMENTATION	Les grenouilles acceptent les petites proies habituelles : drosophiles (*Drosophila melanogaster* et *Drosophila hydei*), collemboles, petits isopodes, grillons tout juste éclos, les plus petites larves de fausse teigne et petits insectes récoltés au filet dans les prairies.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Ameerega cainarachi* est diurne et vit sur le sol de la forêt. Chez ce genre, les mâles sont territoriaux et chantent depuis des emplacements fixes.
AIRE D'ORIGINE	Pérou.