herpy

DENDROBATES

Yurimaguas Poison Frog

Ameerega hahneli

Ameerega hahneli est une petite grenouille venimeuse diurne de 17-22 mm, aux bandes latérales claires et au ventre bleu, qui vit dans la litière de feuilles de la forêt tropicale humide dans une grande partie des basses terres amazoniennes. Le mâle transporte les têtards jusqu'à une eau courante, et les têtards ont besoin d'un courant dans l'eau. L'espèce est commune dans la nature, mais rare en captivité.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Epipedobates hahneli; Dendrobates hahneli*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**17-22 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**6-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 50 × 50 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**23-25 °C**
Température, nuit	**19-21 °C**
Hygrométrie	**65-90 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**7-12 mois**
Œufs par ponte	**6-33**
Éclosion	**4-16 jours**
Durée du stade larvaire	**55-65 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien d'*Ameerega hahneli*, et les besoins peuvent varier selon les différentes formes et les éventuelles espèces cryptiques.
TEMPÉRATURE	*Ameerega hahneli* a besoin de 23-25 °C le jour et de 19-21 °C la nuit. Des tubes fluorescents placés à l'extérieur du terrarium peuvent fournir à la fois la lumière et la chaleur nécessaire.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité doit être de 65-90 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Il doit toujours y avoir un peu d'eau à disposition, par ex. dans la rigole de drainage ou dans un bac peu profond contenant 1-2 cm d'eau.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage peut être constitué de tubes fluorescents ou de LED au spectre adapté aux plantes, pendant 10-12 heures.
ALIMENTATION	La petite mouche du vinaigre (*Drosophila melanogaster*) est la nourriture principale. Les adultes prennent aussi la grande mouche du vinaigre (*Drosophila hydei*), mais la dédaignent souvent, car elle est un peu trop grosse.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est diurne et vit au sol, mais elle est surtout active tôt le matin, en fin d'après-midi et le soir ; le reste de la journée, elle est plus craintive. À l'aube et au crépuscule, les mâles chantent presque sans interruption, par une longue suite de courts sifflements ; l'appel de la parade nuptiale ne comporte que trois notes.
AIRE D'ORIGINE	Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela, Guyana, Guyane française et Suriname.