herpy

DENDROBATES

Manu Poison Frog

Ameerega macero

Ameerega macero est un petit dendrobate diurne de 24-30 mm originaire des forêts tropicales autour de Manu, dans le sud-est du Pérou et l'ouest du Brésil. La tête et le dos sont d'un rouge vif, les flancs noirs avec une raie jaune, et le ventre bleu avec un réseau noir. L'espèce est rarement détenue, et on dispose de peu de connaissances sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Epipedobates macero*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**2-3 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**25-28 °C**
Température, nuit	**21-25 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**4-16**
Éclosion	**10-22 jours**
Durée du stade larvaire	**70-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien d'*Ameerega macero*.
TEMPÉRATURE	La température diurne est de 25-28 °C, et la nuit elle baisse de 3-4 degrés, à 21-25 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 70 et 100 % : proche de 100 % le matin et le soir, de préférence avec de la brume, et autour de 70-80 % en milieu de journée.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une gamelle peu profonde avec 1-2 cm d'eau suffit. Elle doit être assez basse pour qu'un jeune puisse en ressortir, et comporter des pierres ou de la mousse sur le bord.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Fournissez un éclairage LED à spectre adapté aux plantes pendant 10-12 heures par jour. Les UVB ne sont pas nécessaires pour les dendrobates ; un éclairage UVB faible (zone 1 de Ferguson) est facultatif.
ALIMENTATION	Dans la nature, la grenouille mange des fourmis, des coléoptères et de petites larves de 2-7 mm.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les mâles chantent depuis le sol ou depuis des troncs bas et défendent vraisemblablement de petits territoires, comme leurs congénères. Dans la nature, une dizaine d'adultes environ peuvent vivre par 1 000 m² le long d'un ruisseau.
AIRE D'ORIGINE	Pérou et Brésil.