herpy

DENDROBATES

Ruby Poison Frog

Ameerega parvula

Ameerega parvula est une petite grenouille dendrobate diurne de 18-24 mm, vivant dans la litière de feuilles de la forêt tropicale, dans l'ouest du bassin amazonien et au pied des Andes. Le dos est noir avec des taches rouge foncé, et la face ventrale est marbrée de bleu et de noir. L'espèce est rarement maintenue en captivité et l'on dispose de peu d'informations sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Epipedobates parvulus; Dendrobates parvulus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**18-24 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**25-26 °C**
Température, nuit	**20-22 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**4-16**
Éclosion	**10-22 jours**
Durée du stade larvaire	**70-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien de *Ameerega parvula*.
TEMPÉRATURE	La température diurne est de 25-26 °C, et la nuit elle est abaissée de 4-5 degrés, à 20-22 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air est de 70-80 % le jour, avec une baisse à environ 70 % en milieu de journée, et proche de 100 % le matin et le soir, de préférence avec de la brume.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un récipient d'eau plat contenant 1-2 cm d'eau permet aux grenouilles de boire et il est indispensable si l'on veut obtenir des pontes, car le mâle y dépose les têtards.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage doit avant tout donner aux plantes un rythme jour-nuit d'environ 12 heures, et une lampe LED pour plantes suffit. Les UVB ne sont pas nécessaires pour les dendrobates, ils sont donc facultatifs.
ALIMENTATION	La nourriture se compose de petits arthropodes vivants : collemboles et drosophiles (*Drosophila melanogaster*), micro-grillons, plancton de prairie tamisé et petits isopodes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est diurne et vit surtout au sol. Les mâles chantent et défendent probablement de petits territoires, comme le font leurs congénères ; un couple est donc la formule la plus sûre dans un terrarium de petite taille.
AIRE D'ORIGINE	Colombie, Équateur et Pérou.