herpy

DENDROBATES

Ameerega pepperi

Ameerega pepperi est une petite grenouille poison noire à rayures jaunes et à marques rouges, orange ou jaunes, originaire du centre du Pérou. Elle vit le long des ruisseaux en forêt, entre 380 et 1 000 m d'altitude, et est vulnérable en raison du défrichement. On dispose de peu de connaissances sur son entretien, qui repose donc sur son habitat et sur des espèces proches.

Famille: Dendrobatidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-12 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et zone humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**21-25 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**75-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**22-44**
Durée du stade larvaire	**35-60 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On sait peu de choses sur l'entretien d'*Ameerega pepperi*. L'espèce vit le long des ruisseaux dans la forêt humide, entre 380 et 1 000 m d'altitude.
TEMPÉRATURE	Pendant la journée, la température doit être de 21-25 °C et la nuit de 18-21 °C. Elle ne doit pas dépasser 27 °C, car les grenouilles poison supportent mal la chaleur.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 75-100 %. Pulvérisez 1 à 3 fois par jour avec de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée, ou utilisez un système de pluie, de sorte que la litière de feuilles soit humide sans être détrempée.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un bac d'eau peu profond avec 1-2 cm d'eau et une pierre ou une branche comme accès suffit. Utilisez de l'eau de pluie, de l'eau osmosée ou de l'eau déchlorée et renouvelez-la tous les 2-3 jours.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Offrez un éclairage adapté aux plantes pendant 10-12 heures par jour, avec de l'ombre et des cachettes. L'UVB n'est pas documenté comme nécessaire pour l'espèce, mais une source d'UVB faible (zone 1 de Ferguson) peut être utilisée.
ALIMENTATION	*Ameerega pepperi* est petite et prend de petites proies : mouches des fruits (surtout *Drosophila melanogaster*, moins *Drosophila hydei*), collemboles et petits isopodes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les mâles sont territoriaux et chantent depuis les pierres. L'espèce se garde de préférence en couple dans un terrarium offrant de nombreuses cachettes.
AIRE D'ORIGINE	Pérou.