herpy

DENDROBATES

Spot-legged Poison Frog

Ameerega picta

Ameerega picta est une petite grenouille à flèches empoisonnées diurne, au dos brun foncé, aux flancs noirs bordés de lignes claires et aux cuisses ornées de taches jaunes à rouges. Elle vit sur le sol forestier, des basses terres amazoniennes jusqu'au pied des Andes, en Bolivie, au Pérou, en Colombie et au Brésil, avec une population isolée au Venezuela. L'espèce est rarement maintenue en captivité : les soins reposent donc sur le climat de son aire de répartition et sur des espèces proches.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Epipedobates pictus; Dendrobates pictus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**22-28 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-12 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**21-25 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**15-40**
Éclosion	**15-22 jours**
Durée du stade larvaire	**40-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien de *Ameerega picta*. L'espèce est rarement maintenue en captivité, et sa vaste répartition altitudinale rend difficile de savoir à quel climat chaque population est adaptée.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 21-25 °C le jour et laissez la température baisser de 3-4 °C la nuit, soit 18-22 °C. L'amplitude au fil de l'année doit rester faible, 1-2 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit être de 70-80 % en milieu de journée et proche de 100 % le matin et le soir.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Prévoyez une coupelle d'eau peu profonde, avec 1-2 cm d'eau, que les grenouilles peuvent facilement quitter, avec des pierres ou de la mousse sur le bord. Les adultes l'utilisent pour déposer les têtards.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est avant tout destiné aux plantes : 10-12 heures par jour avec des LED au spectre adapté aux plantes. Il n'est pas démontré que *Ameerega picta* ait besoin d'UVB.
ALIMENTATION	Dans la nature, la grenouille se nourrit de petits arthropodes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Ameerega picta* est diurne et vit surtout au sol. Les mâles du genre défendent de petits territoires : un couple est donc la formule la plus sûre. Ne maintenez pas deux mâles ensemble dans un petit terrarium.
AIRE D'ORIGINE	Bolivie, Brésil, Pérou, Colombie et Venezuela.