herpy

DENDROBATES

Cordillera Azul Poison Frog

Ameerega rubriventris

Ameerega rubriventris est une petite grenouille dendrobate sombre de 21 à 25 mm, ornée de bandes latérales claires et d'un ventre marbré de rouge et de noir ou d'orange et de noir. Elle vit uniquement dans les forêts de la Cordillera Azul, dans le centre du Pérou, et elle est menacée. L'espèce est rarement maintenue en terrarium et l'on dispose de peu de connaissances sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Epipedobates rubriventris*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**21-25 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 50 × 50 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**25-28 °C**
Température, nuit	**21-25 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**4-16**
Éclosion	**10-22 jours**
Durée du stade larvaire	**70-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de *Ameerega rubriventris*.
TEMPÉRATURE	La température diurne est de 25 à 28 °C, et la nuit elle est abaissée de 3 à 4 degrés, soit 21 à 25 °C. La température ne varie que de 1 à 2 degrés au cours de l'année et une période de repos hivernal n'est pas nécessaire.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit se situer à 70-80 % dans la journée et proche de 100 % le matin et le soir, de préférence avec de la brume.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un récipient d'eau peu profond contenant 1 à 2 cm d'eau suffit, et il doit être facile d'y entrer et d'en sortir.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage doit avant tout couvrir les besoins des plantes : une lampe LED pour la croissance des plantes pendant 10 à 12 heures par jour et une nuit bien marquée.
ALIMENTATION	Les grenouilles mangent de petits arthropodes vivants : drosophiles (*Drosophila melanogaster* et, pour les adultes, aussi *D. hydei*), collemboles, micro-grillons, petits isopodes et plancton de prairie tamisé.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Ameerega rubriventris* est diurne et vit sur le sol de la forêt, mais grimpe volontiers. Le mâle appelle par un pépiement qui évoque le chant d'un oiseau, le plus souvent 2 à 3 courts sifflements à la suite.
AIRE D'ORIGINE	Pérou.