herpy

DENDROBATES

Silverstone's Poison Frog

Ameerega silverstonei

Ameerega silverstonei est une grenouille dendrobate rouge orangé d'environ 4 cm, connue uniquement de la Cordillera Azul, sur les versants orientaux des Andes, au Pérou. Elle vit en forêt de montagne fraîche, vers 1 300-1 500 m d'altitude, est menacée par la perte de son habitat et reste rarement élevée. Son entretien exige un terrarium frais.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Epipedobates silverstonei; Dendrobates silverstonei; Phobobates silverstonei*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**4-5 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-12 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 50 × 50 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**20-24 °C**
Température, nuit	**17-20 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**15-16 mois**
Œufs par ponte	**30-45**
Éclosion	**30 jours**
Durée du stade larvaire	**55-60 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de *Ameerega silverstonei*. Celui-ci repose sur le climat de la forêt de montagne vers 1 300-1 500 m : frais, humide et stable toute l'année.
TEMPÉRATURE	Le jour, la température doit être de 20-24 °C, de préférence dans le bas de la fourchette, et la nuit de 17-20 °C. Elle ne doit pas dépasser 25 °C. Un air frais n'est pas un problème tant que les écarts restent faibles.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 70-100 % : environ 70 % en milieu de journée et jusqu'à 100 % le matin et le soir.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une gamelle d'eau peu profonde avec 1-2 cm d'eau suffit. Utilisez de l'eau de pluie, de l'eau osmosée ou de l'eau déchlorée, et renouvelez-la souvent. L'eau doit être fraîche, comme l'air.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce vit sur un sol forestier ombragé ; l'éclairage doit donc être modéré, avec des zones d'ombre. Des tubes fluorescents ou des LED à spectre adapté aux plantes, 10-12 heures par jour, suffisent.
ALIMENTATION	*Ameerega silverstonei* accepte des proies de petite à grande taille : grosses drosophiles (*Drosophila hydei*), grillons tout juste éclos, plus petites larves de fausse teigne et petits insectes capturés au filet fauchoir dans les prairies.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est craintive et se réfugie souvent sous les feuilles ou l'écorce de liège. Elle peut être maintenue en groupe, mais les mâles sont territoriaux ; gardez donc un couple ou un groupe comptant plus de femelles que de mâles.
AIRE D'ORIGINE	Pérou.