herpy

DENDROBATES

Three-striped Poison Frog

Ameerega trivittata

Ameerega trivittata est une grande grenouille dendrobate diurne de 4 à 6 cm, qui vit sur le sol de la forêt amazonienne. Elle est noire avec deux rayures vert clair le long des flancs, et le mâle porte souvent 15 à 30 têtards sur le dos en une seule fois pour les conduire à l'eau. Cette grenouille demande un terrarium plus spacieux que les petites dendrobates.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Epipedobates trivittatus; Dendrobates trivittatus; Phobobates trivittatus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**4-6 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et zone humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**70 × 50 × 50 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**23-25 °C**
Température, nuit	**19-22 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**12-24 mois**
Œufs par ponte	**15-40**
Éclosion	**15-22 jours**
Durée du stade larvaire	**40-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un terrarium d'au moins 70 × 50 × 50 cm (longueur, largeur, hauteur) convient pour deux *Ameerega trivittata* adultes.
TEMPÉRATURE	La température diurne est maintenue à 23-25 °C, et la nuit elle est abaissée de 3 à 4 °C, soit environ 19-22 °C. L'amplitude sur l'année doit rester faible, 1 à 2 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité doit se situer à 80-90 % la majeure partie de la journée, près de 100 % le matin et le soir, et elle peut descendre à environ 70 % en milieu de journée.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une gamelle d'eau peu profonde, avec 1 à 2 cm d'eau, suffit. Elle doit être assez basse pour qu'un jeune puisse en sortir, avec des pierres ou de la mousse sur le bord.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les UVB ne sont pas documentés comme nécessaires pour les dendrobates en général, et il n'existe aucune information pour cette espèce. Un léger éclairage UVB (zone 1 de Ferguson) est facultatif.
ALIMENTATION	L'alimentation se compose de petits arthropodes vivants.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les mâles chantent fort et défendent de petits territoires, tandis que les femelles sont calmes. On ne sait pas documenter le comportement de l'espèce en groupe en captivité ; le couple est donc la formule la plus sûre.
AIRE D'ORIGINE	Bolivie, Brésil, Colombie, Guyana, Pérou, Suriname et Venezuela.