herpy

DENDROBATES

Cauca Poison Frog

Andinobates bombetes

Andinobates bombetes est une petite grenouille dendrobate diurne de 17-19 mm, originaire des forêts de nuages des Andes colombiennes. Elle est noire à brun foncé, avec des motifs rouges ou orange sur l'avant du corps, et dépend de broméliacées remplies d'eau. L'espèce est vulnérable dans la nature et l'on dispose de peu de connaissances sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Ranitomeya bombetes; Dendrobates bombetes; Minyobates bombetes*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**17-19 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 50 × 60 cm** L × l × H pour 5 adultes
Température, jour	**22-25 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**1-2**
Éclosion	**16-24 jours**
Durée du stade larvaire	**108-112 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien d'*Andinobates bombetes*.
TEMPÉRATURE	La température de jour doit être de 22-25 °C, et la nuit elle peut descendre à 18-21 °C, comme en forêt de montagne. Maintenez la température sous 27 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 80-100 % et jamais inférieure à 70 %. Pulvérisez deux fois par jour, matin et après-midi, ou utilisez un système de brumisation ou de pluie avec de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une coupelle d'eau n'est pas nécessaire ; les grenouilles boivent les gouttes sur les plantes et l'eau de pulvérisation.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est avant tout destiné aux plantes : un éclairage horticole 10-12 heures par jour donne un rythme jour-nuit et favorise la croissance.
ALIMENTATION	L'alimentation se compose de petits arthropodes : collemboles, petites drosophiles (*Drosophila melanogaster*), petits isopodes et grillons tout juste éclos. Les jeunes tout juste métamorphosés ne prennent que des collemboles.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Andinobates bombetes* est diurne et reste bas dans le terrarium, dans la litière de feuilles et près des broméliacées. Les mâles chantent surtout le matin.
AIRE D'ORIGINE	Colombie.