herpy

DENDROBATES

Samaná Poison Frog

Andinobates daleswansoni

Andinobates daleswansoni est une petite grenouille dendrobate diurne de 18-20 mm, à la tête et à l'avant du corps d'un rouge vif et à l'arrière du corps brun. Elle ne vit que dans la forêt de nuages de la Cordillera Central, dans le département de Caldas, en Colombie. L'espèce est menacée et n'est guère maintenue en captivité ; les soins reposent donc sur le climat montagnard frais et humide de son habitat.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Ranitomeya daleswansoni*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**18-20 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**18-22 °C**
Température, nuit	**14-17 °C**
Hygrométrie	**85-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**1-2**
Éclosion	**16-24 jours**
Durée du stade larvaire	**108-152 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM
On dispose de peu de connaissances sur l'entretien d'*Andinobates daleswansoni*, et l'espèce n'est guère maintenue en captivité.

TEMPÉRATURE
La température n'a pas été mesurée dans l'habitat de l'espèce. 18-22 °C le jour et 14-17 °C la nuit conviennent à une forêt de nuages située à 1 800-2 500 m d'altitude.

HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION
L'humidité de l'air doit être de 85-100 %. Vaporisez soigneusement feuilles et plantes une à deux fois par jour avec de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée, ou utilisez un système de brumisation sur minuterie.

EAU ET QUALITÉ DE L'EAU
L'espèce n'a pas besoin de partie aquatique. Les animaux trouvent l'humidité dans les feuilles, les plantes et les vaporisations. Les têtards se développent dans l'eau des aisselles de feuilles des broméliacées.

ÉCLAIRAGE ET UVB
Offrez 10-12 heures de lumière par jour avec des LED, afin que les plantes prospèrent. Le sous-bois de la forêt de nuages est ombragé : l'éclairage ne doit donc pas être fort, et les animaux doivent pouvoir trouver de l'ombre.

ALIMENTATION
Andinobates daleswansoni ne mesure que 18-20 mm et mange de petits arthropodes comme les collemboles et les petites drosophiles.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION
L'espèce est diurne et vit sur le sol, dans la litière de feuilles, où elle utilise cavités et cachettes. Le comportement territorial et le chant ne sont pas documentés.

AIRE D'ORIGINE
Colombie.