herpy

DENDROBATES

Tolima Poison Frog

Andinobates dorisswansonae

Andinobates dorisswansonae est une petite grenouille venimeuse diurne de 16-19 mm, noire ou brun foncé avec des taches rouges, orange ou jaunes. Elle n'est connue que d'un petit fragment de forêt dans le nord du Tolima, en Colombie. L'espèce est vulnérable et n'est guère maintenue en captivité ; les soins reposent donc sur le climat montagnard frais et humide de son habitat.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Ranitomeya dorisswansonae*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**16-19 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**18-22 °C**
Température, nuit	**14-17 °C**
Hygrométrie	**85-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**1-2**
Éclosion	**16-24 jours**
Durée du stade larvaire	**108-152 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On sait peu de choses sur l'entretien d'*Andinobates dorisswansonae*, et l'espèce n'est guère maintenue en captivité.
TEMPÉRATURE	La température n'a pas été mesurée dans l'habitat de l'espèce. 18-22 °C le jour et 14-17 °C la nuit conviennent à une forêt située à environ 1 800 m d'altitude.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 85-100 %. Vaporisez abondamment feuilles et plantes une ou deux fois par jour avec de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée, ou utilisez un système de brumisation sur minuterie.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'espèce n'a pas besoin de partie aquatique. Les animaux trouvent l'humidité dans les feuilles, les plantes et la vaporisation. Les têtards se développent dans l'eau des réservoirs foliaires des broméliacées.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Prévoyez 10-12 heures d'éclairage par jour avec des LED, afin que les plantes prospèrent. La forêt a une canopée dense ; la lumière ne doit donc pas être forte, et les animaux doivent pouvoir trouver de l'ombre.
ALIMENTATION	*Andinobates dorisswansonae* ne mesure que 16-19 mm et se nourrit de petits arthropodes, surtout de fourmis dans la nature.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est diurne et vit au sol, dans la litière de feuilles. Le comportement territorial n'est pas documenté. Un couple peut être maintenu ensemble dans un terrarium de 45 × 45 × 45 cm.
AIRE D'ORIGINE	Colombie.