herpy

DENDROBATES

Andean Poison Frog

Andinobates opisthomelas

Andinobates opisthomelas est une petite grenouille dendrobate diurne de 15-20 mm, originaire de la cordillère des Andes en Colombie, où elle vit dans la litière de feuilles des forêts de montagne humides d'Antioquia et de Caldas. L'espèce est vulnérable à l'état sauvage, et on ne dispose pratiquement d'aucune donnée sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Ranitomeya opisthomelas; Dendrobates opisthomelas; Minyobates opisthomelas*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-20 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 50 × 60 cm** L × l × H pour 5 adultes
Température, jour	**22-25 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**1-2**
Éclosion	**16-24 jours**
Durée du stade larvaire	**108-112 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On ne dispose pratiquement d'aucune donnée sur l'entretien d'*Andinobates opisthomelas*, et l'espèce n'est guère maintenue en captivité.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit être de 22-25 °C et peut baisser la nuit à 18-21 °C, comme en forêt de montagne. Maintenir la température sous 27 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 80-100 % et jamais inférieure à 70 %. Vaporiser deux fois par jour, matin et après-midi, ou utiliser un brumisateur ou un système de pluie avec de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un bac à eau n'est pas nécessaire ; les grenouilles boivent les gouttes sur les plantes et l'eau de vaporisation.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est avant tout destiné aux plantes : un éclairage horticole de 10-12 heures par jour assure le rythme journalier et la croissance.
ALIMENTATION	L'alimentation se compose de petits arthropodes : collemboles, petites drosophiles (*Drosophila melanogaster*) et petits isopodes. Les jeunes tout juste métamorphosés ne prennent que des collemboles.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Andinobates opisthomelas* est diurne et vit au sol ; elle reste donc dans la partie basse du terrarium, dans la litière de feuilles et près des broméliacées.
AIRE D'ORIGINE	Colombie.