herpy

DENDROBATES

Santander Poison Frog

Andinobates virolinensis

Andinobates virolinensis est une petite grenouille dendrobate diurne, atteignant 19 mm, à la tête et à l'avant du corps écarlates et à l'arrière du corps brun. Elle ne vit que dans la forêt de nuages de la cordillère Orientale des Andes, en Colombie. L'espèce est vulnérable à l'état sauvage et n'est probablement pas maintenue en captivité ; les conditions d'élevage reposent donc sur le climat de montagne frais et humide de son habitat.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Ranitomeya virolinensis; Dendrobates virolinensis; Minyobates virolinensis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**19 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 60 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**19-23 °C**
Température, nuit	**15-19 °C**
Hygrométrie	**85-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**1-2**
Éclosion	**16-24 jours**
Durée du stade larvaire	**108-152 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien d'*Andinobates virolinensis*, et l'espèce n'est probablement pas maintenue en captivité.
TEMPÉRATURE	La température n'a pas été mesurée dans l'habitat de l'espèce. 19-23 °C le jour et 15-19 °C la nuit conviennent à une forêt de nuages située à 1 300-2 400 m d'altitude.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit être de 85-100 % avec une litière de feuilles humide toute l'année.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'espèce n'a pas besoin de partie aquatique. L'eau se trouve dans les aisselles foliaires des broméliacées, où grandissent les têtards ; elle doit être renouvelée régulièrement pour ne pas se troubler.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*A. virolinensis* vit à l'ombre sur le sol de la forêt ; l'éclairage est donc avant tout destiné aux plantes. Prévoyez 10-12 heures de lumière par jour avec des LED ou des tubes fluorescents, et l'obscurité la nuit.
ALIMENTATION	L'alimentation se compose de petits arthropodes : collemboles et drosophiles (*Drosophila*) de la plus petite taille, et petits cloportes. Nourrissez 3 à 4 fois par semaine et laissez toujours des proies vivantes dans le terrarium.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Le comportement en captivité n'est pas documenté. À l'état sauvage, plusieurs adultes partagent la même broméliacée ; l'espèce tolère donc probablement la compagnie et peut être maintenue en couple ou en petit groupe.
AIRE D'ORIGINE	Colombie.