herpy

DENDROBATES

Anthony's Poison Arrow Frog

Epipedobates anthonyi

Epipedobates anthonyi est une petite grenouille à flèches empoisonnées rouge et rayée de 19-27 mm du sud-ouest de l'Équateur et du nord-ouest du Pérou. C'est la grenouille qui, depuis des décennies, est vendue sous le nom de « tricolor », et c'est sans doute la grenouille à flèches empoisonnées la plus gardée et la plus élevée de toutes : robuste, hardie, chanteuse et reproductrice assidue.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates anthonyi; Phyllobates anthonyi*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**19-27 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-14 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt sèche**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**22-26 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**5-10 mois**
Œufs par ponte	**10-40**
Éclosion	**9-14 jours** à 22-24 °C
Durée du stade larvaire	**43-89 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Quasi menacée (NT)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un terrarium d'au moins 40 × 40 × 40 cm convient à un mâle et deux femelles d'*Epipedobates anthonyi*. Un groupe de 5-10 animaux a besoin d'au moins 60 × 60 × 40 cm, et davantage d'animaux demandent plus de surface au sol.
TEMPÉRATURE	Maintenez 22-26 °C le jour, avec des zones à la fois plus fraîches et plus chaudes, et laissez la température descendre à la température ambiante la nuit, autour de 18-21 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit se situer à 80-100 %. L'espèce supporte jusqu'à 50 % pendant de courtes périodes si elle a accès à de l'eau, mais une faible humidité sans eau peut vite devenir mortelle.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Aménagez un ou plusieurs petits points d'eau contenant environ 2 cm d'eau, par exemple des soucoupes, des gamelles ou des demi-coques de noix du Brésil, dont les grenouilles sortent facilement.
ÉCLAIRAGE ET UVB	La lumière est destinée aux plantes. Des tubes fluorescents ou des barres LED pendant environ 12 heures par jour suffisent, et la durée du jour peut varier un peu au fil de l'année.
ALIMENTATION	*Epipedobates anthonyi* est petite, mais gourmande, et prend des proies relativement grosses.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Epipedobates anthonyi* est diurne, hardie et souvent visible, et les mâles chantent par une trille, surtout le matin et après la brumisation.
AIRE D'ORIGINE	Équateur et Pérou.