herpy

DENDROBATES

Marbled Poison Frog

Epipedobates boulengeri

Epipedobates boulengeri est une petite grenouille venimeuse diurne d'environ 17-24 mm, au dos brun foncé et ornée d'une bande latérale claire et continue. Elle vit dans la forêt tropicale de basse altitude le long de la côte pacifique, du sud-ouest de la Colombie au nord-ouest de l'Équateur. L'espèce n'est guère maintenue en terrarium et on dispose de peu de données sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates boulengeri; Phyllobates boulengeri*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**17-24 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**22-26 °C**
Température, nuit	**19-22 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**10-30**
Éclosion	**9-14 jours**
Durée du stade larvaire	**42-70 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de données sur l'entretien d'*Epipedobates boulengeri*, et l'espèce n'est guère maintenue en terrarium.
TEMPÉRATURE	Maintenez 22-26 °C le jour, avec des zones un peu plus fraîches et un peu plus chaudes dans le terrarium, et 19-22 °C la nuit. La température ambiante et l'éclairage suffisent normalement ; les tapis chauffants sont inutiles.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité doit être de 80-100 %. Brumisez plusieurs fois par jour ou utilisez un système de pluie, par exemple trois fois par jour pendant 20-60 secondes, éventuellement complété par un brumisateur.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une coupelle d'eau peu profonde, avec 1-2 cm d'eau, par exemple une soucoupe basse ou une demi-coque de noix du Brésil, offre aux grenouilles un endroit pour boire et se baigner et sert de site de reproduction lorsque le mâle dépose les têtards.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est destiné aux plantes : tubes fluorescents ou barres LED environ 12 heures par jour. Les espèces proches prospèrent sans UVB, qui sont donc facultatifs.
ALIMENTATION	Les grenouilles reçoivent de petites proies vivantes : collemboles et mouches des fruits (*Drosophila melanogaster*), et les adultes prennent en outre la plus grosse *Drosophila hydei* et des grillons fraîchement éclos.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les espèces du genre sont diurnes, terrestres et territoriales, et les mâles chantent depuis des emplacements fixes. Le chant n'est pas décrit plus précisément pour *E. boulengeri* au sens strict.
AIRE D'ORIGINE	Colombie et Équateur.