herpy

DENDROBATES

Darwin Wallace poison frog

Epipedobates darwinwallacei

Epipedobates darwinwallacei est une petite grenouille poison noire de 13-20 mm, ornée de taches orange à jaunes. Elle vit dans la forêt de montagne autour de Mindo, dans le nord-ouest de l'Équateur, et elle est menacée. Depuis 2024, elle est considérée comme un synonyme d'*Epipedobates espinosai*. On dispose de peu de connaissances sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**13-20 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**20-24 °C**
Température, nuit	**18-20 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Partie aquatique** profondeur 2-5 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**10-30**
Éclosion	**9-14 jours**
Durée du stade larvaire	**42-70 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien d'*Epipedobates darwinwallacei*, et l'espèce n'est guère détenue.
TEMPÉRATURE	Maintenez 20-24 °C le jour et 18-20 °C la nuit. Cela correspond à la partie fraîche de la plage qui convient à *Epipedobates tricolor*, de la même altitude.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit être de 80-100 %. Brumisez plusieurs fois par jour ou utilisez un système de pluie, par exemple trois fois par jour pendant 20-60 secondes, éventuellement complété par un brumisateur.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Prévoyez une petite zone d'eau fixe avec 2-5 cm d'eau et une pente douce ou une rampe, afin que les grenouilles puissent facilement en sortir.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est destiné aux plantes : tubes fluorescents ou rampes LED pendant environ 12 heures par jour. Les espèces proches se portent bien sans UVB, qui sont donc facultatifs.
ALIMENTATION	Les grenouilles reçoivent de petites proies vivantes : collemboles et mouches des fruits (*Drosophila melanogaster*) ; les adultes prennent en plus la plus grande *Drosophila hydei* et des grillons nouvellement éclos.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*E. darwinwallacei* est diurne et se déplace à découvert entre les herbes et le feuillage. Le chant ressemble beaucoup à celui des *E. espinosai* brunes de basse altitude.
AIRE D'ORIGINE	Équateur.