herpy

DENDROBATES

Espinosa Poison Frog

Epipedobates espinosai

Epipedobates espinosai est une petite grenouille venimeuse diurne de 13-20 mm, au dos brun cuivré à rouge foncé, noir à taches orange chez certaines populations. Elle vit en forêt humide de plaine et au pied de la cordillère des Andes, dans le nord-ouest de l'Équateur. L'espèce n'est guère maintenue en captivité et l'on dispose de peu de connaissances sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates espinosai; Phyllobates espinosai; Epipedobates darwinwallacei*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**13-20 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**22-26 °C**
Température, nuit	**19-22 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**10-30**
Éclosion	**9-14 jours**
Durée du stade larvaire	**42-70 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Données insuffisantes (DD)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien d'*Epipedobates espinosai*, et l'espèce n'est guère maintenue en captivité.
TEMPÉRATURE	Maintenez 22-26 °C le jour, avec des zones un peu plus fraîches et un peu plus chaudes dans le terrarium, et 19-22 °C la nuit. Les animaux de Mindo et d'autres sites d'altitude se portent mieux du côté frais.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité doit être de 80-100 %. Vaporisez plusieurs fois par jour ou utilisez un système de pluie, par exemple trois fois par jour pendant 20-60 secondes, si possible complété par un brumisateur.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une coupelle d'eau peu profonde avec 1-2 cm d'eau, par exemple une soucoupe basse ou une demi-coque de noix du Brésil, offre aux grenouilles un endroit pour boire et se baigner, et sert de site de dépôt des têtards lorsque le mâle les transporte.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est destiné aux plantes : tubes fluorescents ou barres LED environ 12 heures par jour. Les espèces proches prospèrent sans UVB, qui sont donc facultatifs.
ALIMENTATION	Les grenouilles reçoivent de petites proies vivantes : collemboles et drosophiles (*Drosophila melanogaster*) ; les adultes prennent en outre la plus grande *Drosophila hydei* et des grillons fraîchement éclos.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*E. espinosai* est diurne et se déplace à découvert parmi l'herbe et les feuilles.
AIRE D'ORIGINE	Équateur.