herpy

DENDROBATES

## Rio Santiago Poison Frog

# *Excidobates captivus*

*Excidobates captivus* est une très petite grenouille à flèches empoisonnées diurne, de 12-17 mm, originaire de la zone frontalière entre le Pérou et l'Équateur. Elle est noire, avec des taches rouge orangé disposées en rangées le long du dos et des taches jaunes sur les membres et le ventre. Elle vit sur le sol de la forêt tropicale humide et de la forêt de montagne.

Famille: Dendrobatidae  Ancien nom: *Dendrobates captivus; Ranitomeya captiva; Adelphobates captivus*

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **12-17 mm**<br>longueur museau-cloaque |
| Espérance de vie | **5-10 ans** |
| Activité | **Le jour** |
| Mode de vie | **Terrestre** |
| Habitat | **Forêt tropicale humide et forêt de montagne** |
| Toxines cutanées à l'état sauvage | **Faibles** |
| Toxines cutanées en captivité | **Aucune**<br>Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps |
| Difficulté | **Expérimenté** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **40 × 40 × 40 cm**<br>L × l × H pour 2 adultes |
| Température, jour | **22-26 °C** |
| Température, nuit | **18-22 °C** |
| Hygrométrie | **80-100 %** |
| Eau | **Pas de gamelle d'eau** |
| UVB | **Facultatifs** |
| Alimentation | **Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)** |
| Détention | **En couple** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Développement | **Têtards portés jusqu'à l'eau** |
| Lieu de ponte | **Au sol** |
| Œufs par ponte | **4-8** |
| Durée du stade larvaire | **65-75 jours**<br>de l'éclosion à la métamorphose |
| Alimentation des larves | **Algues/plantes et aliment complet** |
| Soins parentaux | **Porte les têtards** |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Annexe II** |
| UICN | **Vulnérable (VU)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| LE TERRARIUM | On dispose de peu de connaissances sur l'entretien d'*Excidobates captivus*. L'espèce vit sur le sol de forêts chaudes à tempérées, constamment humides. |
| TEMPÉRATURE | La température des localités de l'espèce n'a pas été mesurée. 22-26 °C le jour et 18-22 °C la nuit se situent entre le climat des basses terres et celui de 800-1200 m d'altitude. |
| HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION | L'humidité de l'air doit être de 80-100 % et le substrat doit rester humide toute l'année. Vaporisez de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie une à deux fois par jour, ou utilisez un système de pluie ou de brumisation. |
| EAU ET QUALITÉ DE L'EAU | Une gamelle d'eau n'est pas nécessaire, car les grenouilles trouvent l'humidité dans la vaporisation et dans la litière de feuilles humide. |
| ÉCLAIRAGE ET UVB | L'espèce vit à l'ombre sur le sol de la forêt ; l'éclairage doit donc avant tout favoriser la croissance des plantes et assurer une journée de 12 heures. Les UVB ne sont pas nécessaires, mais restent facultatifs. |
| ALIMENTATION | *Excidobates captivus* est si petite qu'elle ne peut prendre que de très petites proies : collemboles, drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*) et les plus petits cloportes. |
| COMPORTEMENT ET MANIPULATION | L'espèce est diurne, mais se cache beaucoup dans la litière. Le mâle émet des sons brefs et stridents depuis des emplacements cachés. Elle se maintient de préférence en couple, car plusieurs individus ensemble peuvent se disputer. |
| AIRE D'ORIGINE | Pérou et Équateur. |