herpy

DENDROBATES

Polkadot Poison Frog

Oophaga arborea

Oophaga arborea est une petite grenouille à flèches empoisonnées de 20-22 mm, qui vit tout en haut des arbres dans la forêt de montagne humide de l'ouest du Panama. Elle est noire ou brune, parsemée de taches jaunes rondes, se reproduit dans des broméliacées situées à 10-16 m au-dessus du sol, et ses têtards se nourrissent exclusivement d'œufs pondus par la femelle. L'espèce est en danger critique d'extinction.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates arboreus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**20-22 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expert**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 45 × 80 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**20-24 °C**
Température, nuit	**15-19 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)**
Œufs par ponte	**4-8**
Éclosion	**14 jours**
Durée du stade larvaire	**40-50 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Œufs non fécondés de la femelle**
Soins parentaux	**Garde les œufs, porte les têtards et nourrit les têtards avec des œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger critique (CR)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On ne dispose pratiquement d'aucune information sur l'entretien de *Oophaga arborea*, et l'espèce est presque inconnue en captivité.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit se situer entre 20 et 24 °C, et la nuit elle doit baisser d'au moins 4-5 °C, jusqu'à environ 15-19 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit se situer entre 70 et 80 % le jour et monter à 100 % la nuit.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une coupelle d'eau n'est pas nécessaire. Les grenouilles trouvent l'humidité dans le brouillard, la pluie et les broméliacées remplies d'eau, qui servent aussi aux têtards.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce vit haut dans la canopée, où la lumière est plus forte qu'au sol, mais le brouillard l'atténue.
ALIMENTATION	Les adultes reçoivent de petites drosophiles aptères, des collemboles, des grillons microscopiques tout juste éclos et du plancton de prairie ; les mêmes proies sont employées pour les autres espèces du genre.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Oophaga arborea* est une grenouille arboricole diurne, rarement vue au sol.
AIRE D'ORIGINE	Panama.