herpy

DENDROBATES

Granular Poison Frog

Oophaga granulifera

Oophaga granulifera est une petite grenouille dendrobate diurne de 19-22 mm, originaire du versant pacifique du Costa Rica et de l'extrême ouest du Panama. La peau est nettement granuleuse, le dos rouge, orange ou vert olive, et les pattes et le ventre vert-bleu à turquoise. L'espèce vit le long de ruisseaux forestiers ombragés, et la femelle nourrit ses têtards avec des œufs non fécondés.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates granuliferus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**19-22 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**6 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**80 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**21-25 °C**
Température, nuit	**17-21 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**12-18 mois**
Œufs par ponte	**2-5**
Éclosion	**19-20 jours**
Durée du stade larvaire	**87-212 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Œufs non fécondés de la femelle**
Soins parentaux	**Garde les œufs, porte les têtards et nourrit les têtards avec des œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien de *Oophaga granulifera*, et l'espèce est rare en terrariophilie.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit se situer entre 21 et 25 °C, et les grenouilles sont les plus actives à 20-22 °C. La nuit, la température doit baisser de 4-5 °C, jusqu'à environ 17-21 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit se situer entre 80 et 90 %, et atteindre 100 % tôt le matin et en fin de journée, lors de la brumisation du terrarium.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un récipient d'eau peu profond de 1-2 cm, par exemple une coupelle basse enterrée dans le sol ou un point d'eau entre les pierres, fournit de l'eau de boisson et de l'humidité.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce vit sur un sol forestier ombragé ; l'éclairage doit donc avant tout couvrir les besoins des plantes.
ALIMENTATION	Les adultes reçoivent de petites drosophiles aptères, des collemboles, des micro-grillons tout juste éclos, les plus petites larves de fausse teigne et du plancton de prairie.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Oophaga granulifera* est farouche et vit de façon très cachée, surtout en saison sèche, où elle se retire presque complètement.
AIRE D'ORIGINE	Costa Rica et Panama.