herpy

DENDROBATES

## Harlequin Poison Frog

# *Oophaga histrionica*

*Oophaga histrionica* est une grenouille à flèches empoisonnées diurne de 3 à 4 cm, originaire de la forêt tropicale de l'ouest de la Colombie, brune à noire avec de grandes taches orange. Les têtards se nourrissent exclusivement d'œufs non fécondés pondus pour eux par la femelle, ce qui fait de cette espèce l'une des dendrobates les plus difficiles à reproduire. Elle est en danger critique d'extinction, et la délimitation de l'espèce a été modifiée en 2018.

Famille: Dendrobatidae  Ancien nom: *Dendrobates histrionicus*

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **3-4 cm**<br>longueur museau-cloaque |
| Espérance de vie | **9 ans** |
| Activité | **Le jour** |
| Mode de vie | **Terrestre** |
| Habitat | **Forêt tropicale humide** |
| Toxines cutanées à l'état sauvage | **Faibles** |
| Toxines cutanées en captivité | **Aucune**<br>Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps |
| Difficulté | **Expert** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **50 × 50 × 50 cm**<br>L × l × H pour 2 adultes |
| Température, jour | **24-26 °C** |
| Température, nuit | **18-21 °C** |
| Hygrométrie | **70-100 %** |
| Eau | **Gamelle d'eau**<br>profondeur 1 cm |
| UVB | **Facultatifs**<br>Zone de Ferguson 1 |
| Alimentation | **Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)** |
| Détention | **En couple** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Développement | **Têtards portés jusqu'à l'eau** |
| Lieu de ponte | **Au sol** |
| Maturité sexuelle | **12 mois** |
| Œufs par ponte | **4-20** |
| Éclosion | **10 jours** |
| Durée du stade larvaire | **90 jours**<br>de l'éclosion à la métamorphose |
| Alimentation des larves | **Œufs non fécondés de la femelle** |
| Soins parentaux | **Garde les œufs, porte les têtards et nourrit les têtards avec des œufs** |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Annexe II** |
| UICN | **En danger critique (CR)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| LE TERRARIUM | Un couple a besoin d'un terrarium de forêt tropicale d'au moins 50 × 50 × 50 cm, et plus grand est préférable. Les *Oophaga* peuvent être territoriaux : ne gardez donc qu'un seul couple, sauf si le terrarium est très grand. |
| TEMPÉRATURE | La température diurne doit se situer entre 24 et 26 °C, et elle est abaissée de 5 à 6 degrés la nuit, à 18-21 °C. La température n'a besoin de varier que de 1 à 2 degrés au cours de l'année, et il n'y a pas de repos hivernal. |
| HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION | L'humidité de l'air doit atteindre 70 à 80 % en milieu de journée et monter jusqu'à près de 100 % le matin et le soir. Le plus simple est d'utiliser un système de pluie et un système de brumisation sur minuterie. |
| EAU ET QUALITÉ DE L'EAU | Une gamelle peu profonde, avec environ 1 cm d'eau et une rampe de pierres ou de mousse, suffit pour les adultes. Utilisez de l'eau osmosée, de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet déchlorée, et changez l'eau souvent. |
| ÉCLAIRAGE ET UVB | L'éclairage sert avant tout aux broméliacées et aux autres plantes. Donnez environ 12 heures de lumière par jour avec des LED ou des tubes fluorescents qui chauffent peu. |
| ALIMENTATION | *Oophaga histrionica* mange de petits arthropodes, dans la nature surtout des fourmis, des termites, des acariens et de petits coléoptères. |
| COMPORTEMENT ET MANIPULATION | *Oophaga histrionica* est diurne. Le mâle chante depuis un perchoir bas, et les mâles défendent leur territoire. Ne gardez donc qu'un seul couple dans le terrarium. Ne manipulez pas les grenouilles. |
| AIRE D'ORIGINE | Colombie. |