herpy

DENDROBATES

Lehmann's Poison Frog

Oophaga lehmanni

Oophaga lehmanni est une rare grenouille venimeuse diurne, originaire d'une petite zone de l'ouest de la Colombie, noire ou brun foncé avec de larges bandes rouges, orange ou jaunes. Elle est en danger critique d'extinction dans la nature, et seuls des animaux nés en captivité ont leur place en terrarium. L'espèce demande un éleveur expérimenté : elle ne supporte pas la chaleur, et les têtards se nourrissent exclusivement des œufs non fécondés de la femelle.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates lehmanni*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3-4 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**4-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**22-24 °C**
Température, nuit	**17-19 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Sur des feuilles au-dessus de l'eau**
Œufs par ponte	**3-10**
Éclosion	**14-28 jours**
Durée du stade larvaire	**60-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Œufs non fécondés de la femelle**
Soins parentaux	**Garde les œufs, porte les têtards et nourrit les têtards avec des œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger critique (CR)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple de *O. lehmanni* doit disposer d'un terrarium d'au moins 60 × 60 × 60 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand est préférable, surtout pour la reproduction.
TEMPÉRATURE	*O. lehmanni* vient de forêts pluviales de montagne fraîches et supporte moins bien la chaleur que la plupart des grenouilles venimeuses.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 70 et 100 % : élevée le matin et le soir, avec de la brume pour atteindre 100 %, et un peu plus basse en milieu de journée, autour de 70 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Les grenouilles n'ont pas besoin de gamelle d'eau, car l'hygrométrie couvre leurs besoins.
ÉCLAIRAGE ET UVB	La grenouille est diurne et vit à l'ombre, sous la canopée.
ALIMENTATION	*O. lehmanni* ne mange que de petits arthropodes vivants. L'alimentation de base se compose de drosophiles aptères, et l'espèce est assez grande pour prendre aussi les *Drosophila hydei*, plus grosses.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*O. lehmanni* est diurne et calme, mais les mâles sont territoriaux et chantent depuis des emplacements fixes. Maintenez l'espèce en couple.
AIRE D'ORIGINE	Colombie.