herpy

DENDROBATES

Vicente's Poison Frog

Oophaga vicentei

Oophaga vicentei est une petite grenouille dendrobate diurne aux couleurs vives, qui atteint 24 mm au maximum et ne vit que dans le centre du Panama. Sa livrée varie du jaune et du rouge au bleu, au gris et au vert, souvent avec un réseau noir. L'espèce est menacée à l'état sauvage et l'on dispose de peu de données sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates vicentei*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**12-24 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 60 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**22-26 °C**
Température, nuit	**19-21 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)**
Œufs par ponte	**1-12**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**42-56 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Œufs non fécondés de la femelle**
Soins parentaux	**Garde les œufs, porte les têtards et nourrit les têtards avec des œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de données sur l'entretien d'*Oophaga vicentei*.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit être de 22-26 °C et la température nocturne de 19-21 °C. Les grenouilles supportent mal la chaleur : évitez les périodes prolongées au-dessus de 28 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 80-100 % et jamais inférieure à 70 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une coupelle d'eau plate contenant 1-2 cm d'eau suffit, car les grenouilles sont de mauvaises nageuses. Gardez-la propre et changez l'eau tous les jours ou tous les deux jours.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les UVB ne sont probablement pas nécessaires, mais un peu d'UVB (zone 1 de Ferguson) ne nuit pas et reste facultatif. Un éclairage horticole de 10-12 heures par jour maintient les plantes en vie, et la nuit doit être obscure.
ALIMENTATION	L'espèce a besoin de proies très petites. L'alimentation de base se compose de petites drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*) et de collemboles, complétés par des pucerons, de petites termites et de petits isopodes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Oophaga vicentei* est diurne. Le mâle chante depuis un endroit en hauteur et repère le site de ponte. Les femelles peuvent manger les œufs d'autres femelles : un couple est donc la solution la plus sûre.
AIRE D'ORIGINE	Panama.