herpy

DENDROBATES

Lovely Poison Frog

Phyllobates lugubris

Phyllobates lugubris est une petite grenouille dendrobate noire de 19-24 mm, ornée de deux bandes dorsales jaunes, dorées ou orange. Elle vit sur le sol de la forêt tropicale de basse altitude du versant caribéen de l'Amérique centrale, du Nicaragua au Panama. On la voit parfois dans le commerce, mais on dispose de peu de connaissances sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**19-24 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**21-25 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-3 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**7-21**
Durée du stade larvaire	**45-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de *Phyllobates lugubris*.
TEMPÉRATURE	La température de jour doit être de 21-25 °C et celle de la nuit de 18-21 °C, comme pour *Phyllobates vittatus*.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 80-100 %, et la terre comme la litière de feuilles doivent toujours rester humides.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Les grenouilles adultes ne boivent pas mais absorbent l'eau par la peau, et un bac peu profond avec 1-3 cm d'eau suffit.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce vit sur le sol de la forêt, où la lumière est tamisée, et la nécessité des UVB n'est pas documentée. Une lampe UVB faible en zone 1 de Ferguson est facultative ; prévoyez alors toujours de l'ombre.
ALIMENTATION	*Phyllobates lugubris* mange surtout des fourmis et des acariens dans la nature.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est diurne et vit cachée parmi les feuilles et les plantes.
AIRE D'ORIGINE	Nicaragua, Costa Rica et Panama.