herpy

DENDROBATES

Phyllobate terrible

Phyllobates terribilis

Phyllobates terribilis est la plus grande des grenouilles à flèches empoisonnées, 4-5 cm, et l'un des animaux les plus toxiques que l'on connaisse dans la nature. Elle ne vit que dans une petite portion de forêt tropicale sur la côte pacifique de la Colombie. Les animaux nés en élevage sont pratiquement non toxiques, hardis et toujours visibles, et l'espèce est devenue l'une des grenouilles à flèches empoisonnées les plus gardées en terrariophilie.

Famille: Dendrobatidae Nom anglais: Golden Poison Frog

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**4-5 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**8-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Fortes**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 50 × 50 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**21-25 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**16-20 mois**
Œufs par ponte	**10-30**
Éclosion	**10-25 jours** à 22-24 °C
Durée du stade larvaire	**30-60 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM
Un couple de *Phyllobates terribilis* a besoin d'un terrarium d'au moins 60 × 50 × 50 cm. Un groupe de 4-6 animaux a besoin d'au moins 90 × 50 × 50 cm, et davantage d'animaux demandent plus de surface au sol.

TEMPÉRATURE
Le jour, il doit faire 21-25 °C, de préférence quelques degrés de plus en haut du terrarium, et la nuit 18-21 °C, ce qui correspond à la température ambiante. La température ne doit pas dépasser 27 °C longtemps.

HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION
L'humidité de l'air doit être élevée, 70-100 %, mais le substrat ne doit pas devenir marécageux. Un système de pluie est le plus simple, par exemple avec trois brumisations par jour de 20-60 secondes, selon les buses.

EAU ET QUALITÉ DE L'EAU
Proposez une ou plusieurs petites gamelles d'eau contenant environ 2 cm d'eau, par exemple des soucoupes ou des demi-coques de noix du Brésil, dont les animaux sortent facilement.

ÉCLAIRAGE ET UVB
La lumière est avant tout destinée aux plantes. Des tubes fluorescents ou des barres LED pendant environ 12 heures par jour suffisent, et la durée du jour peut varier un peu au fil de l'année.

ALIMENTATION
Phyllobates terribilis prend des proies plus grosses que la plupart des grenouilles à flèches empoisonnées. Dans la nature, les fourmis sont la nourriture principale, mais elle prend de nombreuses sortes de petits arthropodes.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION
Phyllobates terribilis est diurne, hardie et curieuse, et elle est visible la majeure partie de la journée, avec une courte pause en milieu de journée.

AIRE D'ORIGINE
Colombie.