herpy

DENDROBATES

Golfodulcean Poison Frog

Phyllobates vittatus

Phyllobates vittatus est une grenouille à flèches empoisonnées noire, ornée de deux nettes bandes orange ou jaunes le long du dos et de pattes marbrées de bleu. Elle ne vit que dans la forêt de plaine autour du Golfo Dulce, dans le sud-ouest du Costa Rica. En terrarium, elle est diurne, chante volontiers et se reproduit assidûment, et le mâle porte lui-même les têtards jusqu'à l'eau.

Famille: Dendrobatidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3-4 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**21-25 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**8-10 mois**
Œufs par ponte	**7-21**
Durée du stade larvaire	**45-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Jusqu'à quatre *Phyllobates vittatus* ont besoin d'un terrarium d'au moins 60 × 45 × 45 cm. Un groupe de 5-6 animaux a besoin de plus de place, par exemple 100 × 60 × 60 cm, ce qui permet aussi de se déplacer au sol et de grimper.
TEMPÉRATURE	Le jour, *Phyllobates vittatus* a besoin de 21-25 °C et la nuit de 18-21 °C, ce que la plupart des pièces d'habitation assurent.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 70 et 100 %. L'espèce tolère jusqu'à 50 % pendant de courtes périodes si elle a accès à de l'eau, mais une faible hygrométrie sans eau peut vite devenir mortelle.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Offrez une écuelle d'eau peu profonde ou un petit coin d'eau avec 1-2 cm d'eau et une pierre ou un morceau d'écorce, pour que les animaux puissent facilement en sortir.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est destiné aux plantes. Des rampes LED ou des tubes fluorescents sur une minuterie pendant 10-12 heures par jour suffisent, et la nuit doit être sombre.
ALIMENTATION	*Phyllobates vittatus* est inhabituelle, car les adultes prennent de plus grosses proies que la plupart des grenouilles à flèches empoisonnées.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Phyllobates vittatus* est diurne, et les mâles ont un appel aigu et trillé. L'espèce peut être gardée en couple ou en groupe.
AIRE D'ORIGINE	Costa Rica.