herpy

DENDROBATES

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya amazonica est une minuscule grenouille à flèches empoisonnées diurne de 16-19 mm, originaire de l'Amazonie autour d'Iquitos, au Pérou, et de Leticia, en Colombie. Elle est noire, avec des bandes rouges, orange ou jaunes et un marbrage bleu-gris sur les pattes, se reproduit dans les broméliacées et passe pour l'un des petits *Ranitomeya* les plus faciles à garder et à reproduire.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates amazonicus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**16-19 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**21-26 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)**
Maturité sexuelle	**5-8 mois**
Œufs par ponte	**2-8**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**60-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet et autres têtards**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple ou un trio de *Ranitomeya amazonica* a besoin d'un terrarium d'au moins 40 × 40 × 40 cm.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 21-26 °C le jour et à 18-21 °C la nuit. Les grenouilles sont les plus actives et se reproduisent le mieux du côté chaud, à 24-26 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 70 et 100 %, de préférence 80-100 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	*Ranitomeya amazonica* nage mal, l'eau doit donc être peu profonde et facile à quitter.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les grenouilles sont diurnes et vivent à l'ombre de la forêt. L'éclairage est avant tout destiné aux plantes : offrez 12-14 heures d'éclairage LED pour plantes par jour.
ALIMENTATION	*Ranitomeya amazonica* est si petite qu'elle ne peut prendre que de petites proies.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Ranitomeya amazonica* est diurne, mais souvent craintive, et surtout les jeunes se cachent beaucoup. Dans un terrarium densément planté avec beaucoup de feuilles mortes, les grenouilles se montrent davantage.
AIRE D'ORIGINE	Pérou et Colombie.