herpy

DENDROBATES

Blessed Poison Frog

Ranitomeya benedicta

Ranitomeya benedicta est une petite grenouille venimeuse diurne de 16-20 mm, originaire de la forêt de basse altitude du nord du Pérou. Sa tête d'un rouge vif et son corps noir orné d'un réseau bleu en font l'une des espèces les plus colorées du genre. Jusqu'en 2008, elle était considérée comme une sous-espèce de *Ranitomeya fantastica*. Dans la nature, elle est vulnérable, mais les animaux nés en captivité se reproduisent volontiers dans un terrarium bien aménagé.

Famille: Dendrobatidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**16-20 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**21-26 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**2-6**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**60-114 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple de *R. benedicta* peut être maintenu dans un terrarium de 40 × 40 × 40 cm.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 21-26 °C le jour et à 18-22 °C la nuit. L'espèce se plaît le mieux autour de 21-24 °C, et la température ne doit pas dépasser 27 °C durablement.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 70 et 100 %. Un bon rythme consiste à approcher 100 % le matin et le soir et 70-75 % en milieu de journée, afin que le terrarium sèche un peu entre les brumisations.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une coupelle d'eau peu profonde ou une broméliacée avec de l'eau à l'aisselle des feuilles suffit.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*R. benedicta* est diurne, et l'éclairage sert avant tout aux plantes. Offrez 12 à 14 heures de lumière par jour, avec des tubes fluorescents ou des LED sur minuterie, toute l'année, et l'obscurité la nuit.
ALIMENTATION	La base de l'alimentation est constituée de petits arthropodes vivants. Les animaux de tout âge prennent des drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*), et les adultes peuvent aussi prendre la plus grosse *D. hydei*.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*R. benedicta* est diurne et peut être un peu craintive, surtout jeune, mais dans un terrarium densément planté offrant des cachettes, les adultes se voient beaucoup. Le mâle se tient bien en vue et chante.
AIRE D'ORIGINE	Pérou.