herpy

DENDROBATES

Tahuayo Poison Frog

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata est l'une des plus petites espèces du genre : seulement 15-17 mm du museau au cloaque. D'un jaune vif à motifs noirs, avec des pattes brunes et un ventre bleu clair, elle vient de la forêt tropicale près d'Iquitos, dans le nord-est du Pérou. Diurne et un peu timide, elle se reproduit volontiers dans des boîtes de pellicule photo et des broméliacées, et convient bien à un éleveur ayant déjà un peu d'expérience.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates flavovittatus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-17 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**30 × 30 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**21-26 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)**
Maturité sexuelle	**5-8 mois**
Œufs par ponte	**2-6**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**60-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet et œufs non fécondés de la femelle**
Soins parentaux	**Porte les têtards et nourrit les têtards avec des œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple de *R. flavovittata* a besoin d'un terrarium d'au moins 30 × 30 × 45 cm, mais plus grand vaut toujours mieux.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 21-26 °C le jour et à 18-21 °C la nuit. La température nocturne est reprise d'espèces apparentées. La température ne doit pas dépasser 27 °C longtemps, et au-delà de 29 °C elle peut être mortelle.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 70-100 %. L'espèce supporte brièvement environ 50 % si elle a accès à de l'eau propre, mais c'est une solution de secours qui peut être mortelle si elle dure.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Offrez aux grenouilles un bac à eau peu profond ou un petit point d'eau, et maintenez le niveau assez bas pour que la plus petite grenouille puisse y tenir avec la tête et le haut du corps hors de l'eau : l'espèce nage mal.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les grenouilles sont diurnes et vivent à l'ombre de la forêt tropicale. L'éclairage sert avant tout aux plantes : un éclairage LED de 12-14 heures par jour convient.
ALIMENTATION	*R. flavovittata* est si petite qu'elle ne peut avaler que de petites proies.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*R. flavovittata* est diurne, vive et un peu timide.
AIRE D'ORIGINE	Pérou.