herpy

DENDROBATES

Mimic Poison Frog

Ranitomeya imitator

Ranitomeya imitator est une petite grenouille à flèches empoisonnées diurne de 16-20 mm, originaire du nord du Pérou. Chaque forme locale imite une autre grenouille toxique de la même région, et l'espèce a été le premier amphibien chez lequel une véritable monogamie a été démontrée : le couple s'occupe ensemble des petits, et la femelle nourrit chaque têtard avec des œufs non fécondés.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates imitator; Ranitomeya intermedia*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**16-20 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**21-26 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**5-8 mois**
Œufs par ponte	**1-8**
Éclosion	**7-16 jours**
Durée du stade larvaire	**60-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet et œufs non fécondés de la femelle**
Soins parentaux	**Garde les œufs, porte les têtards et nourrit les têtards avec des œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple de *R. imitator* a besoin d'un terrarium d'au moins 45 × 45 × 45 cm. Les grenouilles aiment grimper, et la hauteur est donc bien exploitée.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 21-26 °C le jour et à 18-22 °C la nuit. L'espèce se plaît le mieux autour de 21-24 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 70 et 100 %. Visez presque 100 % le matin et le soir et 70-75 % en milieu de journée, afin que le terrarium puisse sécher un peu entre les brumisations.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une écuelle d'eau peu profonde ou une broméliacée avec de l'eau à l'aisselle des feuilles suffit.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*R. imitator* est diurne et vit à l'ombre de la canopée. L'éclairage sert avant tout aux plantes. Offrez un éclairage LED pendant 12-14 heures par jour, par exemple de 8 h à 20 h.
ALIMENTATION	L'alimentation de base se compose de petits arthropodes : drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*), collemboles et petits cloportes. Les grands adultes peuvent aussi prendre la plus grosse *D. hydei*.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*R. imitator* est hardie et diurne et se voit souvent à découvert dans le terrarium. Le mâle appelle depuis des postes fixes, et les deux sexes défendent le territoire du couple contre leurs congénères.
AIRE D'ORIGINE	Pérou.