herpy

DENDROBATES

## Red-backed Poison Frog

# *Ranitomeya reticulata*

*Ranitomeya reticulata* est l'une des plus petites grenouilles à flèches empoisonnées : seulement 13-17 mm, avec un dos cuivré à orange et des pattes gris bleuté marquées d'un réseau noir. Elle vit dans la forêt de plaine amazonienne, dans le nord-est du Pérou et l'est de l'Équateur. En terrarium, elle est hardie et vive, mais exigeante, car les œufs sont difficiles à trouver et les jeunes difficiles à mener à l'âge adulte.

Famille: Dendrobatidae  Ancien nom: *Dendrobates reticulatus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **13-17 mm**<br>longueur museau-cloaque |
| Espérance de vie | **5-10 ans** |
| Activité | **Le jour** |
| Mode de vie | **Arboricole et terrestre** |
| Habitat | **Forêt tropicale humide** |
| Toxines cutanées à l'état sauvage | **Faibles** |
| Toxines cutanées en captivité | **Aucune**<br>Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps |
| Difficulté | **Expérimenté** |

### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **30 × 30 × 45 cm**<br>L × l × H pour 2 adultes |
| Température, jour | **22-26 °C** |
| Température, nuit | **18-22 °C** |
| Hygrométrie | **70-100 %** |
| Eau | **Gamelle d'eau**<br>profondeur 1-2 cm |
| UVB | **Facultatifs** |
| Alimentation | **Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)** |
| Détention | **En couple** |

### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Développement | **Têtards portés jusqu'à l'eau** |
| Lieu de ponte | **Au sol** |
| Œufs par ponte | **1-8** |
| Éclosion | **10-14 jours** |
| Durée du stade larvaire | **60-80 jours**<br>de l'éclosion à la métamorphose |
| Alimentation des larves | **Algues/plantes et aliment complet** |
| Soins parentaux | **Porte les têtards** |

### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Annexe II** |
| UICN | **Préoccupation mineure (LC)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| LE TERRARIUM | Un couple de *R. reticulata* a besoin d'un terrarium d'au moins 30 × 30 × 45 cm, idéalement de 40 × 40 × 45 cm ou plus. Les grenouilles grimpent volontiers, de sorte que la hauteur est mise à profit. |
| TEMPÉRATURE | Maintenez le terrarium à 22-26 °C le jour et à 18-22 °C la nuit. La température ne doit pas dépasser 27 °C longtemps, et au-delà de 29 °C elle peut être mortelle. La chaleur est toujours plus dangereuse que le froid. |
| HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION | L'hygrométrie doit se situer entre 70 et 100 %. Un bon rythme consiste à viser presque 100 % le matin et le soir et 70-75 % en milieu de journée, afin que le terrarium sèche un peu entre les pulvérisations. |
| EAU ET QUALITÉ DE L'EAU | Une coupelle d'eau peu profonde ou une broméliacée retenant de l'eau à l'aisselle de ses feuilles suffit. |
| ÉCLAIRAGE ET UVB | *R. reticulata* est diurne et l'éclairage sert avant tout aux plantes. Offrez 12-14 heures de lumière par jour, par exemple des LED de 8 h à 20 h, et l'obscurité la nuit. Il n'est pas documenté que l'espèce ait besoin d'UVB. |
| ALIMENTATION | L'alimentation de base se compose de petits arthropodes. Les jeunes et la plupart des adultes acceptent des drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*), et les grands adultes peuvent aussi prendre la plus grosse *D. hydei*. |
| COMPORTEMENT ET MANIPULATION | *R. reticulata* est vive et hardie et se voit souvent à découvert, comme si elle ignorait combien elle est petite. Les mâles appellent depuis des emplacements fixes par un bourdonnement aigu et bref. |
| AIRE D'ORIGINE | Pérou et Équateur. |