herpy

DENDROBATES

## Sira Poison Frog

# *Ranitomeya sirensis*

*Ranitomeya sirensis* est une petite grenouille dendrobate diurne de 15-25 mm, originaire de l'est du Pérou, du nord de la Bolivie et de l'extrême ouest du Brésil. L'espèce regroupe les formes autrefois vendues sous les noms de « lamasi » et de « biolat », et la plupart d'entre elles comptent parmi les dendrobates les plus faciles à reproduire. Ces grenouilles se plaisent en groupe lorsque l'espace est suffisant.

Famille: Dendrobatidae  Ancien nom: *Ranitomeya lamasi; Dendrobates lamasi; Dendrobates sirensis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **15-25 mm**<br>longueur museau-cloaque |
| Espérance de vie | **5-10 ans** |
| Activité | **Le jour** |
| Mode de vie | **Arboricole et terrestre** |
| Habitat | **Forêt tropicale humide et forêt de montagne** |
| Toxines cutanées à l'état sauvage | **Faibles** |
| Toxines cutanées en captivité | **Aucune**<br>Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps |
| Difficulté | **Intermédiaire** |

### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **45 × 45 × 45 cm**<br>L × l × H pour 3 adultes |
| Température, jour | **21-25 °C** |
| Température, nuit | **18-21 °C** |
| Hygrométrie | **80-100 %** |
| Eau | **Gamelle d'eau**<br>profondeur 1-2 cm |
| UVB | **Facultatifs** |
| Alimentation | **Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)** |
| Détention | **En couple ou en groupe** |

### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Développement | **Têtards portés jusqu'à l'eau** |
| Lieu de ponte | **Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)** |
| Maturité sexuelle | **5-8 mois** |
| Œufs par ponte | **1-8** |
| Éclosion | **10-14 jours** |
| Durée du stade larvaire | **58-80 jours**<br>de l'éclosion à la métamorphose |
| Alimentation des larves | **Algues/plantes et aliment complet** |
| Soins parentaux | **Garde les œufs et porte les têtards** |

### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Annexe II** |
| UICN | **Préoccupation mineure (LC)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| LE TERRARIUM | Un couple ou un trio de *R. sirensis* nécessite un terrarium d'au moins 45 × 45 × 45 cm. |
| TEMPÉRATURE | Maintenez le terrarium à 21-25 °C le jour et à 18-21 °C la nuit. La température ne doit pas dépasser 27 °C pendant une période prolongée, et au-delà de 29 °C, c'est dangereux. |
| HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION | L'humidité de l'air doit se situer entre 80 et 100 %. L'espèce ne tolère que brièvement une humidité descendant à 50 %, et seulement si elle a accès à l'eau ; une faible humidité sans eau peut rapidement être mortelle. |
| EAU ET QUALITÉ DE L'EAU | Un récipient d'eau peu profond ou une broméliacée avec de l'eau à l'aisselle des feuilles suffit. |
| ÉCLAIRAGE ET UVB | *R. sirensis* est diurne, et l'éclairage sert avant tout aux plantes. Offrez 12-14 heures de lumière par jour avec des tubes fluorescents ou des LED, et l'obscurité la nuit. Il n'est pas documenté que l'espèce ait besoin d'UVB. |
| ALIMENTATION | L'alimentation de base se compose de petits arthropodes : drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*), collemboles et petits cloportes. Les adultes prennent aussi la plus grande *D. hydei* et des grillons fraîchement éclos. |
| COMPORTEMENT ET MANIPULATION | *R. sirensis* est souvent craintive et se cache volontiers ; un terrarium densément planté avec de nombreuses cachettes offre donc le plus à observer. Le mâle appelle pour attirer une femelle vers un site de ponte. |
| AIRE D'ORIGINE | Bolivie, Brésil et Pérou. |