herpy

DENDROBATES

Summers' Poison Dart Frog

Ranitomeya summersi

Ranitomeya summersi est une petite grenouille dendrobate diurne de 16-21 mm, originaire de la vallée du Huallaga au Pérou, orange ou cuivrée avec un marbrage noir et un masque noir sur les yeux. L'espèce est menacée à l'état sauvage, les œufs sont difficiles à trouver et les grenouilles sont rapides et farouches : elle convient donc surtout à un éleveur déjà expérimenté avec les dendrobates.

Famille: Dendrobatidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**16-21 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**30 × 30 × 45 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**21-26 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**4-9**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**60-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple ou un petit trio de *R. summersi* peut être hébergé dans un terrarium d'au moins 30 × 30 × 45 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand vaut mieux.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 21-26 °C le jour et à 18-21 °C la nuit. La température ne doit pas dépasser 27 °C durablement, et au-delà de 29 °C elle est mortelle. L'espèce supporte moins bien la chaleur que la fraîcheur.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité doit se situer entre 70 et 100 %. Un bon rythme consiste à approcher 100 % le matin et le soir et 70-75 % en milieu de journée, afin que le terrarium puisse un peu sécher entre les pulvérisations.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une coupelle d'eau peu profonde ou une broméliacée dont les aisselles des feuilles contiennent de l'eau suffit.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*R. summersi* est diurne, et l'éclairage sert avant tout aux plantes. Offrez 12-14 heures de lumière par jour et l'obscurité la nuit. Il n'est pas documenté que l'espèce ait besoin d'UVB.
ALIMENTATION	L'alimentation de base se compose de petits arthropodes vivants. Les juvéniles et les jeunes prennent des drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*), et les grands adultes peuvent aussi accepter la plus grosse *D. hydei*.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*R. summersi* est diurne, rapide et souvent farouche, mais elle peut devenir plus hardie une fois habituée au terrarium. On les voit surtout dans un terrarium densément planté et pourvu de cachettes.
AIRE D'ORIGINE	Pérou.