herpy

DENDROBATES

Red Uakari Poison Frog

Ranitomeya uakarii

Ranitomeya uakarii est une très petite grenouille poison diurne de 13-16 mm, originaire du bassin amazonien. Elle est noire, avec des bandes rouges à orange, des flancs jaunes et des pattes bleues, et elle est rare dans le hobby. Son entretien repose sur l'expérience acquise avec le genre, et l'espèce convient à un éleveur confirmé, patient, disposant d'un approvisionnement stable en minuscules proies.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates uakarii*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**13-16 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-6 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**21-25 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)**
Œufs par ponte	**2-7**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**60-100 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple ou un trio de *Ranitomeya uakarii* a besoin d'un terrarium d'au moins 45 × 45 × 45 cm. Cette dimension est empruntée au genre.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 21-25 °C le jour et à 18-21 °C la nuit. Ces valeurs sont empruntées au genre. Un chauffage supplémentaire est rarement nécessaire dans une pièce chauffée.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 70 et 100 %. Vaporisez quotidiennement, de sorte que l'humidité avoisine 100 % le matin et le soir et 70-75 % en milieu de journée. Le terrarium peut ainsi sécher un peu entre les vaporisations.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une coupelle d'eau peu profonde ou une broméliacée dont les aisselles de feuilles retiennent de l'eau suffit.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*Ranitomeya uakarii* est diurne, et l'éclairage sert avant tout aux plantes. Offrez 12-14 heures de lumière par jour avec des tubes fluorescents ou des LED, et l'obscurité la nuit.
ALIMENTATION	L'alimentation de base se compose de petits arthropodes : drosophiles aptères, collemboles, petits cloportes blancs et grillons tout juste éclos.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Ranitomeya uakarii* est diurne.
AIRE D'ORIGINE	Brésil, Colombie et Pérou.