herpy

DENDROBATES

Brazilian Poison Frog

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii est une petite grenouille dendrobate diurne de 17-19 mm, originaire de l'ouest de l'Amazonie. Elle vit dans les arbres et élève ses têtards dans l'eau qui s'accumule dans les broméliacées. La femelle nourrit les têtards avec des œufs non fécondés.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates vanzolinii*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**17-19 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-6 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**23-26 °C**
Température, nuit	**19-23 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)**
Œufs par ponte	**1-6**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**60-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet et œufs non fécondés de la femelle**
Soins parentaux	**Porte les têtards et nourrit les têtards avec des œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple de *Ranitomeya vanzolinii* a besoin d'un terrarium d'au moins 40 × 40 × 40 cm, de préférence 50 × 50 × 50 cm.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit se situer entre 23 et 26 °C ; la nuit, elle est abaissée de 3-4 °C, à 19-23 °C. L'écart au cours de l'année doit rester faible, 1-2 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 70-100 %. Le matin et le soir, elle doit être proche de 100 %, et à midi elle peut descendre à 70-75 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un récipient d'eau n'est pas indispensable pour les adultes, mais il est avantageux, et il peut être peu profond, avec 1-2 cm d'eau.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les besoins en lumière de *Ranitomeya vanzolinii* sont modestes. La grenouille a besoin de suffisamment de lumière pour voir sa nourriture, et les plantes en ont besoin de davantage.
ALIMENTATION	*Ranitomeya vanzolinii* se nourrit de petits arthropodes vivants : drosophiles, collemboles, petits isopodes tropicaux et grillons tout juste éclos. De petits animaux exigent de petites proies.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Ranitomeya vanzolinii* est diurne, mais timide. Dans un terrarium densément planté et riche en cachettes, elle se montre plus souvent que dans un terrarium sobre.
AIRE D'ORIGINE	Brésil et Pérou.