herpy

DENDROBATES

Variable Poison Frog

Ranitomeya variabilis

Ranitomeya variabilis est une petite grenouille à flèches empoisonnées diurne de 15-20 mm, originaire des versants orientaux des Andes et de l'Amazonie. Elle présente de nombreuses formes locales jaunes, vertes et bleues au dessin noir, se reproduit dans les broméliacées et est connue parce que le mâle transporte les têtards d'une réserve d'eau à l'autre de la plante. Une bonne première espèce parmi les petites grenouilles à flèches empoisonnées.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates variabilis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-20 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**21-26 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)**
Œufs par ponte	**1-10**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**60-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet et autres têtards**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple de *R. variabilis* a besoin d'un terrarium d'au moins 40 × 40 × 40 cm, et les mêmes dimensions suffisent pour un trio. Chaque grenouille supplémentaire a besoin d'environ 4 litres de plus.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 21-26 °C le jour et à 18-22 °C la nuit. L'espèce supporte brièvement jusqu'à 27 °C, mais la température ne doit jamais dépasser 29 °C. Les œufs et les têtards peuvent être gardés à 24 °C constants.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit être de 70-100 %. Visez presque 100 % le matin et le soir et 70-75 % en milieu de journée.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Offrez aux grenouilles une écuelle d'eau peu profonde ou un petit coin d'eau, et gardez l'eau assez basse pour que la plus petite grenouille puisse s'y asseoir avec la tête et le haut du corps hors de l'eau ; l'espèce nage mal.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les grenouilles sont diurnes et vivent à l'ombre de la forêt. L'éclairage est avant tout destiné aux plantes : un éclairage LED de 12-14 heures par jour convient.
ALIMENTATION	*R. variabilis* est si petite qu'elle ne peut prendre que de petites proies : collemboles, drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*) et petits cloportes. Les grands adultes peuvent aussi prendre *D. hydei*.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*R. variabilis* est diurne et paisible. Les mâles appellent depuis des postes surélevés, et dans la nature, l'espèce a un système d'accouplement libre, sans couples fixes ni territoires défendus.
AIRE D'ORIGINE	Pérou, Équateur, Colombie, Brésil et Guyane française.