herpy

DENDROBATES

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya ventrimaculata

Ranitomeya ventrimaculata est un petit dendrobate diurne de moins de 18 mm, originaire de la forêt tropicale de l'est de l'Équateur, du nord-est du Pérou et du sud-est de la Colombie. Au sens strict, il est noir, avec de fines rayures rose pâle et un réseau bleu-gris sur les pattes et le ventre. Pendant des décennies, ce nom a désigné d'autres espèces dans le hobby : il est donc important de savoir à quels animaux on a réellement affaire.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates ventrimaculatus; Dendrobates minutus ventrimaculatus; Dendrobates duellmani; Ranitomeya duellmani*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-17 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**21-26 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**1-4**
Durée du stade larvaire	**60-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet et autres têtards**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	L'espèce au sens strict est presque inconnue en terrarium, et il n'existe aucune expérience d'entretien qui la concerne précisément. Les valeurs données ici sont les mêmes que pour les autres petites *Ranitomeya*.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 21-26 °C le jour et à 18-22 °C la nuit. La température ne doit jamais dépasser 29 °C, et les petits terrariums deviennent vite trop chauds en été.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 70-100 % : proche de 100 % le matin et le soir, et de 70-75 % en milieu de journée.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Offrez aux grenouilles une gamelle peu profonde ou un petit point d'eau de 1-2 cm de profondeur, afin que la plus petite grenouille puisse y rester la tête et le haut du corps hors de l'eau ; les petits dendrobates nagent mal.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les grenouilles sont diurnes et vivent à l'ombre de la forêt. L'éclairage sert avant tout aux plantes : 12-14 heures par jour avec des LED sont courantes.
ALIMENTATION	*Ranitomeya ventrimaculata* est si petite qu'elle ne peut prendre que de petites proies : collemboles, drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*), petits cloportes tropicaux et grillons fraîchement éclos.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Ranitomeya ventrimaculata* est diurne et vit surtout dans la litière du sol forestier. Les mâles appellent par un bourdonnement rapide.
AIRE D'ORIGINE	Équateur, Pérou et Colombie.